

Grøftekant på Huslodsvej Botanisk analyse d. 1-9-2020



Foto Susanne Ladefoged

Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen

Indledning

I forbindelse med DN afdeling Kalundborg og Kalundborg kommunes projekt ”Flora- og faunapletter” er en strækning på 100 m sået til d. 3-6-2020 på Huslodsvej. Herunder kommer en floraliste fra de 4 felter fra 1-9-2020. Felterne er fint markeret, og felt 1 er markeret med en jernpæl. Ophør af felt 1 markeres af en stor hvid sten, hvilket de øvrige felter også er.

Felt 1

Felt 1 ligger lige nord for en grusvej og et læbælte på Huslodsvejs venstre side set imod nord.

Ager-Snerle	Horse-Tidsel
Ager-Stedmoderblomst	Humle-Sneglebælg
Ager-Tidsel	(Kinesisk) Hundetunge
Alm. Hønsetarm	Klinter
Alm. Kvik	Korn-Valmue
Alm. Røllike	Kornblomst
Alm. Vej-Pileurt	Lancet-Vejbred
Bleg Pileurt	Lugtløs Kamille
Blæresmelde	Mælkebøtte sp.
Blød Storkenæb	Pyrenæisk Storkenæb
Enårig Rapgræs	Ru Svinemælk
Espersette	Skive-Kamille
Farve-Gåseurt	Skærm-Vortemælk
Foder-Spergel	Snerle-Pileurt
Glat Vejbred	Sort Natskygge
Gråbynke	Storkronet Ærenpris
Gul Kløver	Svine-Mælde
Gul Okseøje	Vinget Bibernelle
Honningurt	

Feltet er domineret af Gul Okseøje og der er en del andre fine blomster, som lyser op i feltet såsom Farve-Gåseurt, Espersette og Honningurt. Der er flere ”vilde” planter end de udsåede, men de ”vilde” arter fylder ikke ret meget bortset fra Gråbynke, som Susanne i øvrigt har hevet op.

Felt 2

Felt 2 ligger lige nord for felt 1 og er også sået til med en købt blanding.

Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Tidsel
Alm. Kvik
Alm. Vej-Pileurt
Bleg Pileurt
Blæresmelde
Enårig Rapgræs
Farve-Gåseurt
Glat Vejbred
Klinter
Korn-Valmue

Kornblomst
Mælkebøtte sp.
Olie-Ræddike
Opret Amarant
Ru Svinemælk
Skærm-Vortemælk
Snerle-Pileurt
Sort Natskygge
Stor Knopurt
Storkronet Ærenpris
Svine-Mælde

Felt nr 2 er stærkt domineret af Klinter (som nu er afblomstret). Af de 23 arter er også mere end halvdelen ikke-udsåede planter, men ”vilde” planter.

Felt 3

Felt 3 ligger nord for felt 2.

Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Tidsel
Alm. Brandbæger
Alm. Katost
Alm. Kvik
Alm. Vej-Pileurt
Bleg Pileurt
Blæresmelde
Enårig Rapgræs
Foder-Spergel
Glat Vejbred
Hunde-Persille

Hyrdetaske
Kornblomst
Lancet-Vejbred
Liden Storkenæb
Lugtløs Kamille
Pyrenæisk Storkenæb
Ru Svinemælk
Skærm-Vortemælk
Snerle-Pileurt
Stor Knopurt
Storkronet Ærenpris
Svine-Mælde

Felt 3 er domineret af Svine-Mælde. Der er kun ganske få udsåede, og måske er det bare lidt spild fra felt 1 og 2. Langt de fleste arter er ”vilde”. Der er en hel del åben sandbund mellem planterne.

Felt 4

Felt 4 ligger nord for felt 3.

Aften-Pragtstjerne
Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Tidsel
Alm. Kvik
Alm. Rajgræs
Alm. Torskemund
Alm. Vej-Pileurt
Alm. Røllike
Bleg Pileurt
Blæresmelde
Cikorie
Enårig Rapgræs
Glat Vejbred
Haremad
Horse-Tidsel
Hyrdetaske

Kornblomst
Lancet-Vejbred
Liden Storkenæb
Liden Torskemund
Lugtløs Kamille
Mark-Forglemmigej
Mælkebøtte sp.
Pyrenæisk Storkenæb
Rank Vejsennep
Ru Svinemælk
Rundbladet Katost
Rød Arve
Rød Tvetand
Skærm-Vortemælk
Snerle-Pileurt
Storkronet Ærenpris
Svine-Mælde

Feltet er også domineret af Svine-Mælde. 34 arter i dette felt, og alle er de ikke-udsåede, dvs. ”vilde” planter fra omgivelserne, fra gruset eller lignende.