

Floraen i Klosterskov Nord, Kalundborg kommune



Klosterskov Nord, den store sø i område 451 B.

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen
November 2020


INDLEDNING

Klosterskov Nord ligger 4 km nord for Kalundborg ud til Mellemvangsvej. Skoven er på ca. 60 ha. Den blev plantet af Skov- og Naturstyrelsen fra 2000 til 2003 på landbrugsjord i omdrift, og mere end halvdelen er udlagt til åbne arealer med søer, enge og overdrev. Den nu frilagte Tranemosegrøften løber igennem skoven. Skoven ejes og drives i dag af Naturstyrelsen, og i denne skov prioriteres naturen højere end friluftslivet. Det er skovens åbne eng-arealer, vi har undersøgt. Vores motivation til at undersøge skoven var at se på, hvordan dette fine naturområde nær Kalundborg udvikler sig.

Der er fri adgang til skoven.

VORES UNDERSØGELSER

Vi har besøgt skoven ca. 1 gang om måneden fra marts til september 2020. Efterfølgende behandler vi de åbne arealer i områderne 451, 452 og 455 hver for sig, og sidst i rapporten er der lister over, hvad vi fandt. Vi følger navngivningen af planterne i den nye "Nordens flora" fra 2020 (Mossberg og Stenberg, 2020). Som sædvanlig har vi også noteret fugle, sommerfugle mv., når vi stødte på dem.



Skovkort over skov nr. 410. Det er de lysegrønne eng-områder 451, 452 og 455, vi har undersøgt.

LANDSKABET

Område 451 (A og B)

På skovkortet og ortofoto herunder ses et mindre område A mod vest (markeret med rødt) og et større område B (også markeret med rødt), som vi har undersøgt.

Det mindre område A mod vest var i marts 2020 halvvejs dækket med vand på den nordlige del. Det fremgår ikke af kortene. Sidst i april, efter en måned uden nedbør, var søen stort set væk, og området var blevet til sump, se figur 2. I sumpen var der både viber og krikænder.

I det sydøstlige hjørne ligger en stor bunke sten, nok gamle marksten, samt en ret stor bunke murbrokker. Her lå en stor gård frem til 1999.

Det store område B er helt mod øst afgrænset af Tranemosegrøften. Området er i øvrigt præget af den store sø, som i 2003 er anlagt af Styrelsen, se forsidefoto. I søen er der ynglende knopsvaner, gråstrubet lappedykker og blishøns, ligesom det er tilfældet i næsten alle de øvrige søer. Tranemosegrøften er frilagt efter at Skov- og Naturstyrelsen erhvervede området. Nord for søen er der et ret lavtliggende moseagtigt område. Helt mod nord er der en lille lund med Bævreasp.

I den tid, vi kom der (marts-september), blev området ikke afgræsset, men der var hegnet. Vegetationen var/er derfor præget af høje urter og græsser.



Figur 1. Kortmosaik af område 451 med udsnit af Naturstyrelsens skovkort til venstre og et ortofoto fra forår 2020 til højre. De med rødt markerede områder, A og B, er de åbne områder, som vi har undersøgt.



Figur 2. Det mindre område 451 A set fra nord med søen/sumpen i forgrunden.

Område 452



Figur 3. Kortmosaik af område 452 med udsnit af Naturstyrelsens skovkort til venstre og et ortofoto fra forår 2020 til højre. Det med rødt markerede område er det, som vi har undersøgt.

Område 452 ligger øst for og op til Tranemosegrøften. Mod syd løber en lille grøft, der afvander til Tranemosegrøften, og helt mod sydvest ligger en lille sump domineret af Strand-Kogleaks (meget tør d. 2/6). Der er også en sø mod øst, som er anlagt 1999. Mod nord i området er terrænet mere vådt, men det var i sidste del af april tørret helt ud.

452 blev ikke afgræsset, mens vi kom her (marts-september), og vegetationen er høj med bl.a. meget Bjerg-Rørhvene og de invasive arter Sildig-Gyldenris og Canadisk-Gyldenris, som breder sig.

Område 455



Figur 4. Kortmosaik af område 455 med udsnit af Naturstyrelsens skovkort til venstre og et ortofoto fra 2018 til højre. De lyse områder er dem, som vi har undersøgt.

Område 455 ligger midt i Klosterskov Nord, tæt på en P-plads ved Mellemvangsvej. Kommer man fra P-pladsen, ligger den udstrakte eng og den store sø meget smukt indrammet af skov. Søen er anlagt i 1999, og der er også en mindre sø øst for den store sø. Helt mod øst hegnes stykket imod den frilagte Tranemosegrøft. Mellem de to søer er der et mindre vådområde, og indtil 1995 lå der en gård ved den østlige ende af den store sø.

Vi så 5-6 køer græsse på engen d. 19-7-20. I september så vi kun 2 køer på området, men i mellemtiden var græsningsområdet udvidet mod syd, så der kunne være andre køer i det areal?

FLORAEN PÅ DE ÅBNE OMRÅDER

Vi har ikke botaniseret i skovene, da skovbundsfloraen er lang tid om at udvikle sig, så det er de åbne arealers flora, vi har undersøgt. Dog har vi bemærket en enkelt plante fra skoven, nemlig den fredede orkidé, Skov-Hullæbe, som gerne indfinder sig i nyplantede skove. Det gælder her, hvor vi fandt den fåtalligt i alle tre områder, endvidere har vi set den i de nyere skove, Vollerup- og Klosterskov Syd.

Modsat i skovene, så er floraen hurtigere til at indfinde sig i søer og på andre fugtige arealer. Her kommer fugle til med frø kort efter omlægningen. Nye enge og overdrev er til gengæld længe om at udvikle sig til botanisk set gode lokaliteter. De fleste arter på enge og overdrev er almindelige og ret ordinære, men lokaliteterne er på vej, og nogle interessante arter er der da.

Område 451 (A og B)

Som nævnt, så blev 451 ikke afgræsset i 2020, og vegetationen er høj med bl.a. meget Gyldenris (både Canadisk – og Sildig G.), Bjerg-Rørhvene og andre høje urter.

I vandhullet/sumpen i det mindre område A (figur 2) står almindelige planter som Alm. Sumpstrå, Fliget Brøndsel, Knæbøjet Rævehale, Lav Ranunkel og Lyse-Siv.

Hvor gården lå, ligger der nu en bunke byggeaffald og marksten. Den 2/6 var der på stenbunken en masse Svaleurt samt Skarntyde, Påskelilje, Foder-Kulsukker, Filtet Burre og Stor Nælde, alle er gamle kulturplanter. Senere noterede vi haveplanten Rød Stenurt, og en anden haveplante, Virginia-Asters, overlever fint helt mod sydvest.

Den store sø i område B (forsidefoto) er omkranset af en høj rørskov med Tagrør, Smalbladet Dunhammer, Blågrøn Kogleaks, Strand-Kogleaks og andre kraftige planter. Ved den sydvestlige bred fandt vi Samel, en sjælden positiv-art i Vestsjælland (Leth, 2006), langs Tranemosegrøften står der Hulkravet Kodriver (Figur 10).

Område 452

Engen mod syd var i juli meget præget af Alm. Hundegræs, Fløjlsgræs og Draphavre. Der var ikke mange blomsterplanter her, og engen ville forbedres ved afgræsning, hvilket også gælder 451.

Helt mod sydvest står en iøjnefaldende og tæt bestand af Strand-Kogleaks. I det lille vandløb (kanal), der fører til Tranemosegrøften, var der lidt Blågrøn Star. Mod nord i 452 står meget Krybende Baldrian, som også er fundet i 451 og 455 (se fig. 8).

Skov-Hullæberne, mindst 10 stk., stod i ege-bevoksningen imod sydvest, og der er også få stk. i ege-bevoksningen længere nordpå.

Svend Åge Hansen, en meget energisk insektmand, har set den sjældne sommerfugl Fransk Bredpande samt skovfirben her.

Område 455

Engen og den store sø er et landskabeligt meget smukt område, når man kommer fra P-pladsen ved Mellemvangsvej. Der er mange fugle og sommerfugle, men engen virker til gengæld noget trivielt med kun få positiv-arter, hvilket ikke er mærkeligt, da jorden er leret, og det kun er 20 år efter ophør af dyrkning, så jorden er stadig rig på næringsstoffer.

På engen vokser Eng-Brandbæger i mængde, og de tiltrækker mange sommerfugle (figur 5), og i sydvest står der mange Alsike-Kløver (figur 6). Eng-Brandbæger er giftig for køer, og Alsike-Kløver er meget giftig for heste. Vi så store bestande af den smukke sommerfugl Blodplet på Eng-Brandbæger, hvor larverne næsten havde spist alle planterne.

Gården, som lå ved øst-enden af søen, afspejler sig tydeligt i floraen med forårsplanter som Erantis, Alm. Vintergæk og med haveplanten Prikbladet Fredløs i mængde. Der står også Balsam-Popler samt et stort æbletræ.



Figur 5. Dagpåfugleøje på Eng-Brandbæger i område 455



Figur 6. Eng i område 455 med masser af Alsike-Kløver.

I den store sø er der store bevoksninger af Vand-Pileurt. Der er også Aks-Tusindblad og Tornfrøet Hornblad i bunden. Ved den nordøstlige og østlige side af den lille sø står Samel i den mudrede jord. Mellem de to søer er der et fugtigere område med Alm. Sumpstrå, Manna-Sødgræs, Knæbøjjet Rævehale, Sø-Kogleaks og Knop-Siv.

Positiv-arter

”Positiv-arter” er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet (Leth, 2006). I tabel 1 står alle de positiv-arter, vi har fundet på de undersøgte områder.

Positiv-art	Kategori	451	452	455
Aks-Tusindblad	SP	x		x
Alm. Fredløs	AP		x	x
Alm. Hvene	AP		x	
Alm. Knopurt	AP	x		
Alm. Star	AP		x	
Blågrøn Star	AP	x	x	
Dunet Dueurt	AP	x	x	x
Dynd-Padderok	AP	x	x	
Engkarse	HP	x		
Hare-Kløver	HP	x	x	x
Harril	AP	x		x
Hulkravet Kodriver	AP	x	x	x
Håret Star	AP	x	x	x
Kamgræs	AP	x		x
Kantet Perikon	AP	x		
Kær-Snerre	AP			x
Mark-Tusindgylden	UP	x	x	x
Nyrebladet Ranunkel	AP		x	

Nøgle-Skræppe	HP	x		
Ris-Dueurt	HP	x		
Samel	SP	x		x
Seline	HP			x
Skov-Hullæbe	AP	x	x	x
Skov-Æble	HP	x	x	x
Sump-Forglemmigej	AP	x		
Smalbladet Kællingetand	AP			x
Stribet Kløver	HP			x
Sump-Kællingetand	HP	x	x	
Sump-Snerre	AP		x	x
Toradet Star	AP	x	x	
Tornfrøet Hornblad	AP			x
Udspærret Dværghunke	UP			x
Vand-Mynte	AP	x	x	x
Vand-Ærenpris	AP	x		x
Øret Pil	HP	x	x	x

Tabel 1. Positiv-arter fra Klosterskov Nord.

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig Positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Antallet af positiv-arter er ikke imponerende, men der er positiv-arter i alle tre områder. De fleste er dog almindelige (AP), men alle 4 kategorier er repræsenterede, se tabel 1 og 2.

Antal	451	452	455
Urter	162	124	144
Træer og buske	41	29	42
Positiv-arter	23	18	22

Tabel 2. Antal plante-arter fra de tre områder i Klosterskoven Nord.

Der er ingen Nationalt eller Regionalt rødlistede planter i Klosterskov Nord. Dog regner Peter Leth Hårfliget Vandranunkel, fundet i 455, for at være regionalt "Næsten Truet" (Leth, 2006). Men dels er planten svær at bestemme, og dels anses den efter Atlas Flora Danica-undersøgelsen for at være "Formodentlig ret alm. på det meste af Øerne ..." (Hartvig, 2015). Endelig anses den ikke længere for at være en art, men blot en varietet af Alm. Vandranunkel (Hårfliget Vandranunkel, *Ranunculus aquatilis* var. *diffusus*).

Det er blandt vandplanterne og planterne fra de våde lokaliteter, at der er flest positiv-arter, da disse hurtigere og lettere finder vej til egnede voksesteder via fuglene. Men nogle af de mere almindelige positiv-arter fra eng og overdrev er der da, bl.a. Alm. Hvene, Alm. Knopurt, Hare-Kløver, Hulkrauet Kodriver, Håret Star, Mark-Tusindgylden, Stribet Kløver og Udspærret Dværgebunke.

DYRENE I KLOSTERSKOV NORD

Klosterskov Nord er ganske rig på fugle knyttet til især skov og søer, og der er mange sommerfugle og andre insekter på enge og overdrev, se listerne bagerst. Der er grøn frø og brune frøer samt skrubtudse i alle søerne. Vi så snog i 452 og 455. Svend Åge Hansen så skovfirben, og hans iagttagelse af sommerfuglen Fransk Bredpande, som er Moderat Truet (EN) på den danske Rødliste 2019, er meget interessant. På vores september-besøg var der en Lærkefalk, som i længere tid jagede rundt i 452 og 455. Rådyr og krondyr er her også. I sandhed er Klosterskov Nord en naturmæssig berigelse for Kalundborg kommune.



Figur 7. Gråstrubet lappedykker fra den store sø i 451. Den ses i de fleste søer i Klosterskov Nord.

SAMMENFATNING

Det er en ganske rig og flot natur, der på kun ca. 20 år har indfundet sig i Klosterskov Nord. I søerne er mange planter og dyr, og de våde områder rummer gode positiv-arter som Aks-Tusindblad, Samel og Seline. De mere tørre områder, enge og overdrev, er præget af næringsrigdom fra tidligere intensiv dyrkning, men positiv-arter er så småt på vej. Vi vil opfordre til, at enge og overdrev fortsat afgræsses, og at der sættes flere dyr på, så enge og overdrev ikke gror til i høje og trivielle urter.

Tak til Anne Bronée for værdifuld hjælp.

Evt. kontakt: carstenbclausen@hotmail.dk

Alle fotos: HGC, undtagen figur 10 og 11: CC.

LITTERATUR

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. - Gyldendal.

Leth Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 – en kommenteret regional rødliste og positivliste. - Dansk Botanisk Forenings hjemmeside (www.botaniskforening.dk).

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens flora. - Gyldendal. Oversat og bearbejdet til dansk af Jon Feilberg.

Rødliste 2019. Den danske Rødliste. - Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.



Figur 8. Krybende Baldrian

**Floralister mv.
Klosterskoven 451**

Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Aks-Tusindblad
Alm. Agermåne
Alm. Bjørneklo
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hønsetarm
Alm. Katost
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Mjødurt
Alm. Mangeløv
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Sumpstrå
Bidende Ranunkel
Bjerg-Rørhvene
Bleggul Snerre
Blære-Star
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blågrøn Kogleaks
Blågrøn Star
Bredbladet Mærke
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Bølget Bunke
Canadisk Gyldenris
Cikorie
Draphavre
Dunet Dueurt
Dynd-Padderok
Eng-Brandbæger
Eng-Kabbeleje
Engkarse
Eng-Rævehale
Enskættet Sumpstrå
Feber-Nellikero
Filtet Burre
Fin Kløver
Fladstrået Siv
Fliget Brøndsøl
Fløjlgræs
Foder-Kulsukker
Foder-Vikke
Følfod
Glanskapslet Siv
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Gold Hejre
Grenet Pindsvineknop
Grøn Høgeskæg
Gråbynke
Gul Fladbælg
Gul Iris
Gul Kløver
Gærde-Kartebolle
Gærde-Snerle

Gåsepotentil
Hare-Kløver
Haremad
Harril
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Humble-Sneglebælg
Hvas Randfrø
Hvidkløver
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Høst-Rødtop
Håret Star
Kamgræs
Kantet Dueurt
Kantet Perikon
Kattehale
Kløftet Storkenæb
Knippe-Star
Knoldet Brunrod
Knold-Rottehale
Knop-Siv
Knæbøjet Rævehale
Korsknap
Kruset Skræppe
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kæmpe-Svingel
Kær-Galtetand
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Lugtløs Kamille
Lyse-Siv
Løgkarse
Lådden Dueurt
Mangebladet Lupin
Manna-Sødgræs
Mark-Forglemmigej
Mark-Krageklo
Mark-Tusindgylden, også
hvide
Mellebrudt Star
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nøgle-Skræppe
Pastinak
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Påskelilje sp.
Rejnfan
Ris-Dueurt
Ru Svinemælk
Rødkløver
Rød Stenurt
Rød Svingel
Rød Tvetand
Samel
Sildig Gyldenris
Skarntyde
Skov-Burre
Skov-Galtetand
Skov-Hullæbe
Skov-Skræppe

Skvalderkål
Smalbladet Dunhammer
Smalbladet Vikke
Småkronet Gedeskæg
Snerle-Pileurt
Stinkende Storkenæb
Storbægret Storkenæb
Stor Fladstjerne
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Stortoppet Hvene
Strand-Kogleaks
Sump-Forglemmigej
Sump-Kællingetand
Svaleurt
Svætevæld
Sylt-Star
Tagrør
Tandfri Vårsalat
Tofrøet Vikke
Toradet Star
Tornløs Hornblad
Vand-Mynte
Vand-Pileurt
Vand-Ærenpris
Vedbend-Ærenpris
Vejbred-Skeblad
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Løg
Virginia-Asters
Vorterod

Træer og buske

Ahorn
Alm. Benved
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Røn
Ask
Avnbøg
Balsampoppel
Blomme sp.
Brombær sp.
Bævreasp
Dun-Birk
Dunet Gedeblad
Engriflet Tjørn
Fuglekirsebær
Glat Hunde-Rose
Glat Vejbred
Grøn Pil
Grå-El
Grå-Pil
Hassel
Havtorn
Hestekastanie
Hvid Kornel
Korbær
Krybende Pil
Kvalkvæd
Landevejs-Poppel
Mangeblomstret Rose
Mirabel
Paradisæble ”John
Downie”
Rød-El

Selje-Pil
Selje-Røn
Skov-Elm
Skov-Æble
Slåen
Stilk-Eg
Storbladet Lind
Vorte-Birk
Øret Pil

Fugle

Blishøne
Dobbeltbekkasin
Fasan
Fiskehejre
Gransanger
Gravand
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gråstrubet Lappedykker
Gærdesmutte
Hvid Vipstjert
Hættemåge
Knopsvane
Krikand
Landsvale
Lille Lappedykker
Løvsanger
Munk
Musvit
Musvåge
Ravn
Ringdue
Rørhøg
Sjagger
Skovskade
Solsort
Stor Flagspætte
Toppet Lappedykker
Tårnfalk
Vibe

Sommerfugle

Admiral
Ager-Ugle
Alm. Blåfugl
Aurora
Blodplet
Dagpåfugleøje
Det Hvide C
Grønåret Kålsommerfugl
Græsråndøje
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Okkergul Råndøje
Sekspletet Køllesværmer
Stor Bredpande
Stor Kålsommerfugl

Andet

Alm. Vandnymfe
Blå Libelle
Grøn frø
Skrubtudse
Krondyr, 1 hjort 2 hinder
Rådyr

Klosterskoven 452

Aften-Pragtstjerne
Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Alm. Bjørneklo
Alm. Fredløs
Alm. Gyldenris
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvene
Alm. Hønsetarm
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Mangeløv
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Røllike
Alm. Skjolddrager
Alm. Star
Alm. Sumpstrå
Bidende Ranunkel
Bjerg Rørhvene
Bleggul Snerre
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blågrøn Kogleaks
Blågrøn Star
Burre-Snerre
Canadisk Gyldenris
Cikorie
Draphavre
Dunet Dueurt
Dynd-Padderok
Eng-Brandbæger
Eng-Rapgræs
Filtet Burre
Fin Kløver
Fløjlgræs
Foder-Kulsukker
Foder-Vikke
Følfod
Gederams
Glanskapslet Siv
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Grenet Pindsvineknop
Grøn Høgeskæg

Gråbynke
Gul Fladbælg
Gul Iris
Gul Kløver
Gul Snerre
Gærde-Snerle
Gåsepotentil
Hare-Kløver
Haremad
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Humle-Sneglebælg
Hvidkløver
Hvid Snerre
Håret Star
Kamgræs
Kantet Dueurt
Kattehale
Kløftet Storkenæb
Knippe-Star
Knoldet Brunrod
Korsknap
Kruset Skræppe
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Løgkarse
Lådden Dueurt
Mark-Forglemmigej
Mark-Tusindgylden,
hvide
Moskus-katost, hvide
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nyrebladet Ranunkel
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Rejnfan
Rank Evighedsblomst
Ru Svinemælk
Rødkløver
Rød Svingel
Rørgræs
Skov-Hullæbe
Smalbladet Dunhammer
Smalbladet Vikke
Småkronet Gedeskæg

Spidskapslet Star
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Stortoppet Hvene
Strand-Kogleaks
Sværvæld
Sump-Kællingetand
Sump-Snerre
Sylt-Star
Tagrør
Tandfri Vårsalat
Tofrøet Vikke
Toradet Star
Tusindfryd
Vand-Mynte
Vand-Pileurt
Vedbend-Ærenpris
Vejbred-Skeblad
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild-Løg
Vorterod

Træer og buske

Ahorn
Alm. Benved
Alm. Hyld
Alm. Æblerose
Brombær sp.
Dun-Birk
Dunet Gedeblad
Engriflet Tjørn
Glat Hunde-Rose
Grøn Pil
Grå-El
Grå-Pil
Hassel
Have-Ribs
Korbær
Kvalkvæd
Mangeblomstret Rose
Mirabel
Rød-El
Selje-Pil
Selje-Røn
Skov-Elm
Skov-Æble
Slåen
Spids-Løn

Stilk-Eg
Storbladet Lind
Vorte-Birk
Øret Pil

Fugle

Blishøne
Bogfinke
Fasan
Fiskehejre
Gransanger
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gråstrubet Lappedykker
Gøg
Lærkefalk
Løvsanger
Munk
Musvit
Rørsanger
Sangdrossel
Skovskade
Solsort
Stor Flagspætte

Sommerfugle

Alm. Blåfugl
Aurora
Blodplet
Blå Libelle
Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Det hvide C
Græsråndøje
Grønåret Kålsommerfugl
Hedelibelle
Lille Ildfugl
Lille Kålsommerfugl
Okkergul Råndøje
Stor Bredpande
Stor Kålsommerfugl

Andet

Alm. Vandnymfe
Brun Frø sp.
Grøn frø
Rådyr
Skrubtudse
Snog

Klosterskoven 455

Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Aks-Tusindblad
Alm. Agermåne
Alm. Bjørneklo
Alm. Brunelle
Alm. Fredløs
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hønsetarm
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Sumpstrå
Alm. Vandranunkel
Alsike-Kløver
Bakke-Forglemmigej
Bakke-Svingel
Bidente-Ranunkel
Bjerg-Rørhvene
Bleggul Snerre
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blågrøn Kogleaks
Bredbladet Dunhammer
Butbladet Skræppe
Cikorie
Draphavre
Dunet Dueurt
Dusk-Syre
Eng-Brandbæger
Eng-Rapgræs
Eng-Rævehale
Erantis
Feber-Nellikerod
Fin Kløver
Filtet Burre
Fløjlsgræs
Foder-Kulsukker
Foder-Vikke
Følfod
Gaffel-Vortemælk
Glanskapslet Siv
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Grenet Pindsvineknop
Gråbynke
Gul Iris
Gul Kløver
Gærde-Snerle
Gåsepotentil
Hare-Kløver
Haremad
Haril
Hjortetrøst

Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Humle-Sneglebælg
Hvidkløver
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Hårfliget Vandranunkel
Håret Star
Kamgræs
Kantet Dueurt
Kattehale
Kløftet Storkenæb
Knippe-Star
Knop-Siv
Knæbøjet Rævehale
Kruset Skræppe
Krybende Baldrian
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kær-Galtetand
Kær-Snerre
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Lyse-Siv
Lådden Dueurt
Manna-Sødgræs
Mark-Forglemmigej
Mark-Tusindgylden, også
hvid
Miliegræs
Mose-Bunke
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Pastinak
Prikbladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Rejnfan
Ris-Dueurt
Ru Svinemælk
Rød Arve
Rød Tvetand
Rødkløver
Samel
Seline
Sildig Gyldenris
Skov-Hullæbe
Skov-Løg
Skærm-Vortemælk
Smalbladet Dunhammer
Smalbladet Kællingetand
Smalbladet Vikke
Småkronet Gedeskæg
Sodfrugtet Pindsvineknop
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Nælde
Storkronet Ærenpris
Stortoppet Hvene
Strand-Kogleaks
Stribet Kløver

Sump-Snerre
Sværtevæld
Sylt-Star
Tagrør
Ten-Pindsvineknop
Tigger-Ranunkel
Tofrøet Vikke
Tornfrøet Hornblad
Tudse-Siv
Tusindfryd
Udspærret Dværgbunke
Vand-Mynte
Vandpest
Vand-Pileurt
Vand-Ærenpris
Vedben-Ærenpris
Vejbred-Skeblad
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vintergæk
Vorterod

Træer og buske

Ahorn
Alm. Benved
Alm. Hyld
Alm. Snebær
Alm. Æble
Alm. Æble-Rose
Ask
Avnbøg
Balsam-Poppel
Bittersød Natskygge
Brombær sp.
Bånd-Pil
Dun-Birk
Dunet Gedeblad
Engriflet Tjørn
Fuglekirsebær
Glat Hunde-Rose
Guld-Pil
Grå-Pil
Hassel
Hvid Kornel
Hvidpil
Hvidtjørn
Korbær
Kvalkved
Landevejspoppel
Mirabel
Purpur-Pil
Rynket Rose
Rød-El
Selje-Røn
Skov-Elm
Skov-Æble
Slåen
Spids-Løn
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Storbladet Lind
Sølv-Poppel

Vorte-Birk
Vrietorn
Øret Pil

Fugle

Blishøne
Blåmejse
Bogfinke
Dompap
Fasan
Fiskehejre
Gransanger
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gråstrubet Lappedykker
Gulspurv
Gærdesmutte
Gøg
Knopsvane
Lærkefalk
Munk
Musvit
Ravn
Ringdue
Rørhøg
Råge
Sangdrossel
Skovskade
Solsort
Stor Flagspætte
Sølvmåge
Tornsanger
Tårnfalk

Andet

Alm. Vandnymfe
Blå Libelle
Butsnudet frø
Grøn frø
Hare
Kransnålalge
Rådyr
Skrubtudse
Snog
Spidssnudet frø

Sommerfugle

Alm. Blåfugl
Blodplet, larve
Blodrød Hedelibelle
Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Græsråndøje
Grønåret Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Okkergul Råndøje
Stor Bredpande
Stor Kålsommerfugl



Figur 9. Gul Iris



Figur 10. Hulkravet Kodriver



Figur 11. Admiral på Hjortetrøst