

Floraen i skovene på Kattrup Gods, 2021



I april dækker Hvid Anemone skovbunden i store dele af Stenhusvænge Skov

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen
Oktober 2021

Indhold	side
Indledning	3
Projektområdet	3
Skovkontinuitet	3
Vores undersøgelse	6
Stenhusvænge Nord	7
Stenhusvænge Syd	12
Bromølle Skov (Kattrup Skov)	14
Eskemose (Askevad Skov)	18
Hollænderhaven	20
Møllervænge	21
Trustrup skov	25
Tæt blomstret Hullæbe	27
Afslutning	30
Litteratur	30
Floralister	31

Fotos: Figur 1,7,11 og 18 CC, øvrige HGC



Figur 1. Krybende Læbeløs.

Indledning

I maj 2021 offentliggjorde Anders og Iben Møller, Kattrup Gods, ideen om "Kattrup Vildnis" på forsiden af Nordvestnyt, 27. maj. "Kattrup Vildnis" bliver til et ca. 900 ha stort, sammenhængende naturområde, hvor store dyr skal helårs afgræsse et indhegnet område. Hele området indgår som en meget vigtig del af Naturpark Åmosen, og man kan læse mere på Kattrupvildnis.dk

Vi blev kontaktet allerede i april 2021 for at høre, om vi ville medvirke til en undersøgelse af området, så der kunne foreligge en beskrivelse, inden projektet bliver virkeliggjort. Vi finder både projekt og område fantastisk spændende og gik straks i gang med at undersøge floraen i skovene. Det er vores håb, at vi med beskrivelsen kan bidrage til en karakterisering af stedets biodiversitet.

Projektområdet

På næste side ses projektområdet for "Kattrup Vildnis", som det så ud i september 2021. Skovene er markeret med grønt, og de dyrkede marker med gult. 200 ha af landbrugsjorden bliver taget ud af produktion og høstes for sidste gang i år (2021).


Mod øst og nord afgrænses området af Åmose Å, Sjællands næststørste å. Her løber åen for størstedelen ureguleret gennem landskabet med et stort fald fra Bromølle Kro til Øresø Mølle, hvor åen skifter navn til Øvre Halleby Å. Vest for åen tårner landskabet sig op i høje randmorænebakker og et kuperet morænelandskab. Jordbunden er meget afvekslende og pletvis meget leret, og består almindeligvis mest af sandblandet ler. Den afvekslende og kuperede jord er vanskelig at dyrke. Selve Kattrup Gods ligger centralt i den sydlige del af området (se nederst på figur 4).

Skovene består mest af løvskove, som er bevokset med Bøg og Eg samt Birk og Ahorn, der er også en del nåleskov, (se figur 2). Det kuperede terræn gør, at der også er en del vådområder, hvor det meste er bevokset med Rød-El, Grå-El, Birk og forskellige pile-arter. Fra bakkerne udspringer vandløb, og der er gravet drængrøfter, som leder vandet væk fra skovene ud mod Åmose Å.

I skovene vokser mange gamle træer imellem nyere beplantninger og langs skovbrynene, der er også mange udgåede træer, som står eller ligger rundt omkring i skovene. Flere af dem er afmærket med skilte, således at de kan bevares for en periode. Efterhånden vil disse træ-ruiner blive nedbrudt af svampe og insekter, inden de formulder, og sammen med ret mange større og mindre sten spredt rundt i skovbunden, samt en hel del stendiger, giver dette en meget afvekslede skovnatur med mulighed for stor biodiversitet.

Kattrup Gods

2021



Figur 2. Projektområde for Kattrup Vildnis, 2021.

Skovkontinuitet

Det har stor betydning for plantevæksten, om skoven har eksisteret på stedet i mange år. Mange skovplanter er dårlige til at sprede sig f.eks. Hvid Anemone (se forsiden), og man taler om "signalarter" som Hulrodet Lærkespore (se figur 11), Alm. Milturt, Hulkravet Kodriver (se figur 18), Hvid-, Gul- og Blå Anemone, der alle indikerer lang skovkontinuitet (Skov- og Naturstyrelsen, 2000).

En anden måde at undersøge om skoven har eksisteret i rigtig mange år er at se på gamle kort. Herunder ses et udsnit af Det Kongelige Videnskabernes Selskabs kort fra 1771. I Danmark var skovene på et minimum i begyndelsen af 1800-tallet, hvor de var reduceret til nogle få % af landet mod i dag ca. 16 %.

Kortudsnittet herunder viser landskabet mellem Åmose Å og Øvre Halleby Å, og vejstykket herimellem er Hallebyorevej. På kortet ses et stort skovparti vest for Hallebyorevej, som ikke findes i dag, det er nu mere eller mindre opdyrket land. De skove, som er omtalt her i rapporten, kan vi genfinde på kortet fra 1771. Dette viser, at de har eksisteret i hvert fald siden da, og måske rækker eksistensen helt tilbage til de første planter indvandrede efter seneste istid?




Figur 3. Udsnit af Det Kongelige Videnskabernes Selskabs kort fra 1771. Fra "Historiske kort" på Nettet.

Det kan ikke udelukkes, at mindre dele af skovene har været opdyrket f.eks. i middelalderen, men det har i så fald været uden den store betydning. Tilmed forhindrer de stejle bakker ned til Åmose Å en opdyrkning. Nogle steder er der også lave områder med meget vand i form af elle-sumpe og moser, samt lidt egentlige søer. Den lerede jordbund har også forhindret opdyrkning i ældre tider. Nogle steder er der mange store sten, hvilket taler imod, at arealerne har været opdyrket. Alt taler således for, at skovene på Katstrup Gods har en meget lang skovkontinuitet.

Vores undersøgelse

Projektområdet er enormt, så vi startede i april 2021 med at gå områder igennem, som vi på forhånd havde lidt kendskab til, og som vi vidste var botanisk værdifulde. Det blev Stenhusvænge og Bromølle skove. Vores ambition var at besøge områderne hyppigt, ca. en gang hver måned. Hen ad vejen har vi besøgt andre skovafsnit mindre hyppigt og lavet floralister herfra. Kortet herunder viser, hvilke skove, vi har floralister fra (se disse side 31), og hvordan vi har afgrænset områderne.

Vi gør under de forskellige afsnit rede for skovene og for deres flora i form af floralister. De mest interessante arter er fremhævet under de forskellige afsnit.



Figur 4. Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens 4 cm kort. De undersøgte skove er markeret med rødt.

Projektområdets åbne afsnit har vi ikke besøgt. Emil Førby og Peter Jannerup fra Kalundborg kommune, vil besøge (dele af) disse § 3-områder, så vi holder os til skovene.

Vi følger navngivningen af planterne i "Nordens Flora" fra 2020 (Mossberg og Stenberg, 2020), og vi noterer også fugle, sommerfugle mv. når vi støder på dem.

Stenhusvænge Nord

Stenhusvænge Nord omfatter i denne rapport arealerne nord for grusvejen, der går fra skyttehuset "Sommerlyst" og til gården "Edelsminde" og nord herfor omfattende Trompetervænge. Mod øst omfatter Stenhusvænge Nord også arealet nord for Bromølle Skov og vest for Åmose Å, (se kort figur 4).

Skoven nord og vest for grusvejen fra "Sommerlyst"

Skoven er ret kuperet med bakker og dale og nogle steder med dybe kanaler, drængrøfter, der generelt løber i retning af Åmose Å. Længs kanalerne er der nogle steder vådområder. Det største område ligger ca. 300 m NØ for "Sommerlyst" (gult område med birk og kanaler på skovkortet). Der er også vådområder andre steder, f.eks. ved "Urmagerhus" længere nordpå. Et vigtigt vådområde, en skovsump, ligger nordvest for den store eng ved "Edelsminde", og det ses på kortet (se figur 4) nord for navnet "Stenhusvænge". Det drænes af lige afvandingskanaler.

Skoven består mest af løvskov med ret gamle bøge- og egetræer. Der er også partier med yngre skov, men der er altid gamle træer imellem de unge. I skovbrynet mod vest ses mange gamle ege og bøge. Ind imellem er der også træ-ruiner og væltede træer, og der ligger meget ved i skovbunden. Der er også nåletræer i området, f.eks. få stk. høje og gamle Rød-Gran. Et område i Trompetervænget hedder "Botanisk Have", det er en større nåletræsbevoksning med Nobilis fra 1990 og nord herfor et parti med Rød-Gran plantet i 1979. Helt mod øst og op til grusvejen er der en bøgebevoksning fra 1892. Skoven er afgrænset mod vest af et stendige, og der er stendiger flere steder i alle skovafsnit. Det samlede indtryk af skoven er en meget stor variation både mht. terræn og træarter samt deres alder.

Forårsfloraen er domineret af Hvid Anemone. De er mest fladedækkende nær "Sommerlyst", men der er hvide anemoner næsten overalt i skoven. Disse er af og til iblandet Alm. Vorterod og Stor Fladstjerne. Af øvrige forårs-arter er der en del Krat-Viol, hist og her Hylster Guldstjerne (figur 10) og Alm. Guldstjerne, og vi fandt også Gul- og Blå Anemone (få), Alm. Bingelurt, Alm. Lungeurt, m.v. Nær "Urmagerhus" vokser der Vintergæk i skovbunden samt lidt Erantis og Dansk Arum. I vådområderne ses Alm. Milturt og i skovsumpen nordvest for engen ved "Edelsminde" vokser der en del Majblomst samt lidt Pille-Star. Her så vi d. 20-5-21 i alt 5 stk. Tyndakset Gøgeurt (se figur 8) og 4 stk. Æglbladet Fliglæbe (se figur 6), men der kan sagtens være flere end det.



Figur 5. Pebertræ, d. 8-4-2021. Et ret sjældent træ eller busk som vi har fundet i både Stenhusvænge Nord og Syd. Det anses for at være måske hjemmehørende i Danmark (Hartvig, 2015).

Hen i august dukker den sjældne orkidé, Tæt blomstret Hullæbe (se figur 17), op langs grusvejen fra "Sommerlyst" mod "Edelsminde". Tæt blomstret Hullæbe findes ca. 35 steder i Jylland (Rødliste 2019), men på Sjælland findes den kun i skovene syd for Jyderup. Næsten alle forekomster ligger på Kattrup Gods jorde, og især står den langs grusvejen. Vi optæller hvert år antallet af planter her, og på side 27 er der en særskilt omtale af registreringerne. Det samlede antal er i størrelsesordenen 20 planter, så selv her, hvor den er hyppigst, er der kun ganske få individer.

Her vokser der også Skov-Hullæbe, den findes til gengæld også i de øvrige skove, vi har undersøgt, og Skov-Hullæbe er Danmarks almindeligste skov-orkidé. I området er vi stødt på en anden orkidé, nemlig Skov-Gøgelilje (se figur 7) i meget beskedent antal. I 2016 talte vi 5 stk., hvoraf de to senere blev dækket af stabilgrus ved den 1. vejgaffel på grusvejen. I år har vi slet ikke fundet den på trods af eftersøgning på rette tidspunkt. Men orkidéer er lunefulde, og der er ikke grund til at tro, at den er forsvundet fra Stenhusvænge. Skov-Gøgelilje er nu Nationalt rødlistet som "Næsten truet" (NT), da den er gået meget tilbage i antal siden sidste Rødlistestatus (Rødliste 2019).

De åbne eng-arealer NV for "Edelsminde" har vi ikke besøgt. Arealerne er aldrig gødet og sprøjtet ifølge lejer af "Edelsminde".

Skoven øst for grusvejen og vest for Åmose Å

Arealet mellem Åmose Å og grusvejen, der går forbi "Edelsminde" og nordpå, og som omfatter Bromølle skov, er et meget bemærkelsesværdigt landskab. Fra Åmose Å rejser bakkerne sig i 25 meters højde over åens niveau op til grusvejen, og skrænterne er nogle steder ganske stejle. Vi har undersøgt skoven fra "Helvedes Kedel", hvor Bromølletunnellen udmunder og nordpå. Selve Bromølletunnellen er en cementtunnel, der fører Åmose Å fra Bromølle Kro og 900 m nordpå gennem skoven. Tunnellen blev bygget i 1957 i forbindelse med tørlægning og dræning af Store Åmose. Her blev Åmose Å rettet ud og gravet langt ned i terræn. Fra tunnellens udmundning løber Åmose Å ureguleret og med stort fald gennem landskabet til lige syd for Øresø Mølle, hvor åen skifter navn til Øvre Halleby Å.

Terrænet ved åen er flere steder fugtigt og sumpet, og langs åen er der nogle steder helt flade skovsumpe og -enge. Når der er meget vand i åen, breder vandet sig nogle steder ind over omgivelserne. En lille km nord for "Helvedes Kedel" er et større skovstykke med El, som vokser på det ret våde og flade terræn. Ellers breder løvskoven sig op over bakkerne. Der er et større stykke med Bøg plantet i 1931, og nord herfor et stykke med Eg, plantet i 1925. Der er også partier med nåletræer og enkelte meget høje Sitka-gran, så skoven er varieret. Langs åen står her og der store træ-ruiner og elletræer, også her er der en del stendiger.

Bakkeskråningerne er i foråret domineret af Hvid Anemone. Hist og her ses Alm. Guldstjerne, Alm. Lungeurt, der er få stk. Blå Anemone f.eks. ved "Helvedes Kedel", hvor vi også så Skavgræs. Der er også pletvist partier med Gul Anemone, og et enkelt sted står der Desmerurt. På de våde partier

ses en del Alm. Milturt, og i august kan man finde Skov-Hullæbe og Tæt blomstret Hullæbe (få stk.) langs "Den grønne sti", der løber parallelt med tunnelen.

Arterne i Stenhusvænge Nord

Vi har fundet 157 forskellige urter og 46 træer og buske, i alt 203 arter.

Som nævnt er det kun Skov-Gøgelilje, som er Nationalt Rødlistet som Næsten Truet (NT) (Rødliste 2019).

Der er 1 art, som er regionalt rødlistede ifølge Leth (2006). "Regionalt" dækker det gamle Vestsjællands Amt. Det drejer sig om Tæt blomstret Hullæbe, Næsten Truet (NT).

Orkidéerne har altid vores opmærksomhed. I Stenhusvænge Nord har vi fundet 5 arter, som er: Skov-Gøgelilje – som vi ikke har set i 2021

Skov-Hullæbe

Tyndakset Gøgeurt

Tæt blomstret Hullæbe

Ægbladet Fliglæbe.



Figur 6. Ægbladet Fliglæbe på vej mod blomstring, fra det våde område NV for "Edelsminde".

Tidligere har vi fundet Skov-Gøgelilje i den del af skoven, der ligger nær Helvedes Kedel. På nogle kort hedder denne del af skoven Bromølle Skov, men vi har altså dette skovafsnit med under Stenhusvænge Nord. En anden orkidé, Rederod, er også rapporteret fra området nær "Helvedes Kedel", (Hartvig 2015, Christiansen et al. 2017), men vi har ikke selv set den her endnu.

Positiv-arter

Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet (Leth 2006).

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Guld nælde	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Blå Anemone	HP
Dansk Arum	SP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Dunet Dueurt	AP
Dynd-Padderok	AP
Engkarse	HP
Firblad	UP
Gul Anemone	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Star	AP
Knold-Ranunkel	AP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Pille-Star	UP
Sildig Skov-Hejre	UP
Skavgræs	SP

Skovbyg	HP
Skov-Hundegræs	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skov-Padderok	AP
Sump-Forglemmigej	AP
Sydlig Lund-Fladstjerne	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Tyndakset Gøgeurt	UP
Vand-Mynte	AP
Vand-Røllike	AP
Ægbladet Fliglæbe	UP

Tabel 1. Positiv-arter fra Stenhusvænge Nord

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Stenhusvænge Nord:

Urter:	157
Træer og buske:	46
I alt:	203
Nationalt Rødlistede:	1
Regionalt Rødlistede:	1
Positiv-arter:	40
Godt undersøgt	6-8 besøg

Stenhusvænge Syd

I Stenhusvænge Syd ligger flere søer ved vejen, der går mod syd fra grusvejen "Sommerlyst"- "Edelsminde". Søen tættest på grusvejen er gravet indenfor de sidste par år. Den er omgivet af jævne arealer uden skov. Ved søen ligger en meget stenrig høj, som måske kunne være et fortidsminde? Nær søen står en del Krybende Læbeløs (se figur 1).

En større sø end den lige nævnte ligger mellem den lille sø og Rævebakken. På skovkortet har området mose-signatur (brun, "mos"), men der er en betragtelig åben vandflade. I kanten af søen står der lidt Kær-Star. Stendiger findes flere steder og afgrænser skoven ud mod åbne marker.

Syd for "Sommerlyst" ligger der en stor ellesump med vandfyldte kanaler, åbent vand og med mange arter. Træerne er både Rød-El og Grå-El. Her er arter som Eng-Kabbeleje, Vandkarse, Fladkravet Kodriver og i vandet er der Vand-Røllike. Ved besøg d. 13-5-2021 fik HGC forstyrret en natugle, som lettede fra et hul i et gammelt træ. Ved et hurtigt besøg d. 20-5-2021 talte vi 18 stk. Ægbladet Fliglæbe uden besvær, og her er helt sikkert flere. Naturtypen Elle-ump er en naturtype, som EU prioriterer at beskytte som naturtype (91EO) (Skov- og Naturstyrelsen 2000).

Et enkelt sted har vi fundet orkidéen Tyndakset Gøgeurt. D. 13-5-2021 talte vi 30 blomstrende eksemplarer. Denne forekomst af Tyndakset Gøgeurt er markeret i bogen om "Naturparken Åmosens vilde orkidéer" (Hans Guldager Christiansen, Carsten Clausen og Peter Leth 2017), hvilket også gælder forekomsten af Tyndakset Gøgeurt nordvest for det åbne areal ved "Edelsminde". På den 3. markering nær "Hovedes Kedel" har vi ikke kunnet finde urten.



Figur 7. Skov-Gøgelilje



Figur 8. Tyndakset Gøgeurt i Stenhusvænge syd. Det venstre eksemplar har helt uplettede blade, mens det højre eks. har ganske små brune pletter på bladene.

Arterne i Stenhusvænge Syd

Vi har fundet 98 urter og 36 træer og buske, i alt 134 arter.

Det er betydeligt færre arter end i Stenhusvænge Nord, men Stenhusvænge Syd er også en del mindre, og landskabet er ikke præget af Åmose Å og de dramatiske bakker ved denne. Vi har tidligere set 2 stk. Skov-Gøgelilje ved 1. vejgaffel fra "Sommerlyst", men vi har ikke set dem i 2021.

Der vokser Tæt blomstret Hullæbe langs grusvejen fra "Sommerlyst", og den er regionalt rødlistet som Næsten Truet (NT), (Leth, 2006).

I Stenhusvænge Syd har vi fundet 5 orkidé-arter:

Skov-Gøgelilje (ikke set i 2021)

Skov-Hullæbe

Tyndakset Gøgeurt

Tæt blomstret Hullæbe

Ægbladet Fliglæbe.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Blå Anemone	HP
Dynd-Padderok	AP
Firblad	UP
Fladkravet Kodriver	HP
Gul Anemone	HP
Gul Frøstjerne	HP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Lådden Perikon	SP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Sanikel	SP
Sildig Skov-Hejre	UP
Skavgræs	SP
Skovbyg	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skov-Hundegræs	HP

Sydlig Lund-Fladstjerne	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Tyndakset Gøgeurt	UP
Vandkarse	UP
Vand-Mynte	AP
Vand-Røllike	AP
Vellugtende Agermåne	SP
Ægbladet Fliglæbe	UP

Tabel 2. Positiv-arter fra Stenhusvænge Syd

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Stenhusvænge Syd:

Urter:	98
Træer og buske:	36
I alt:	134
Regionalt Røddistede:	1
Positiv-arter:	30
Godt undersøgt	6-8 besøg

Bromølle Skov (Kattrup Skov)

På 4 cm kortet figur 3 hedder skoven Kattrup Skov, men på Kattrup Gods eget skovkort kaldes skoven for Bromølle Skov, hvilket vi så også gør. Bromølle Skov strækker sig fra Kattrupvej i syd og op til "Helvedes Kedel". Terrænet er ret kuperet med de lavest liggende partier ned mod Åmose Å og de højeste mod vest. En skovsti, "Den grønne sti", går langs med åen fra Kattrupvejs begyndelse mod nord til "Helvedes Kedel", og her vokser blandt meget andet Vellugtende Agermåne, Hvid Hestehov (se figur 9) og en del Skavgræs.

Skoven består for det meste af ret ny bøgeskov plantet ca. år 2000, men der er en hel del store bøgetræer blandt de yngre træer. Mod nord er der et større parti af nåletræer (Nordmannsgran). En skovvej går langs hele skovens vestlige skel, og her står mange gamle og imponerende bøge- og egetræer.

Skovbunden er domineret af Hvid Anemone, og der findes stort set alle forårsplanterne i mindre mængde: Alm. Lungeurt, Alm. Guldstjerne, Alm. Milturt, Alm. Bingelurt, Hulrodet Lærkespore, lidt

Liden Lærkespore, Marts-Viol, Skov- og Krat-Viol og Gul Anemone, som står tæt især langs Kattrupvej. Et sted langs den vestlige skovvej ses også Hylster-Guldstjerne.

Ved Kattrupvej er der en kilde ("Kilden"). Her er et nedlagt pumpehus, og en betragtelig dæmning stemmer vandet fra kilden op til et større bassin, "Karpedam". Vandet løber herfra gennem skovbunden og ned mod Åmose Å i et strøg, der er bevokset med en imponerende mængde af Hvid Hestehov, som forløber helt ned til "Den grønne sti".

Der er skovenge og moseagtige partier langs den nedgravede Åmose Å. Engene er varieret bevokset med urter, træer og buske. Der er mest Tagrør, men vegetationen er afvekslende. Arter som Skov-Padderok og Krybende Læbeløs går igen, og der er ualmindelige arter som Skov-Kogleaks og Vellugtende Agermåne. Terrænet stiger op mod "Den grønne sti", hvor vi så få stk. Sanikel og Druemunke, og Skavgræs står massivt flere steder.

Både i skovens sydøstlige hjørne og langs skovvejen mod øst ses en del kultur-arter som Citronmelisse, Påskelilje, Vild Tulipan og Vintergæk. Et sted langs skovvejen ses en stor bestand af den forvildede haveplante Storrodet Storkenæb, som meget vel kan stamme fra udsmid fra det nærliggende hus.



Figur 9. Hvid Hestehov i et vådt parti ved "Den grønne sti" ovenfor Åmose Å. Hvid Hestehov er en sjælden og regionalt rødlistet som Sårbar (VU). Den kan ses i det tidlige forår, endda fra bilvinduet, hvor Kattrupvej begynder lige syd for Bromølle Kro.

Arterne i Bromølle Skov

Skoven er botanisk set en rig skov, hvor vi fandt 163 urter, 46 træer og buske, i alt 209 arter. Det ret høje antal skyldes givetvis det kuperede terræn samt forskellige våde naturtyper plus en tilsyneladende varieret jordbund og den lange skovkontinuitet.

Vi fandt 3 regionalt rødlistede arter, nemlig Hvid Hestehov (Sårbar, VU) og Vår-Fladbælg (Sårbar, VU). Tæt blomstret Hullæbe (regionalt Næsten Truet (NT)) fandt CC tæt ved "Helvedes Kedel" i 2 eksemplarer. Orkidéerne Skov-Gøgelilje, Rederod og Tyndakset Gøgeurt er tidligere fundet nær Bromølle tunnells udløb. I år har vi ikke set nogle af disse orkidéer her, derimod talte vi 50 stk. Skov-Hullæbe langs "Den grønne sti" ved besøg d. 14-6-2021.

I "Oversigt over botaniske lokaliteter 1. Sjælland" (Gravesen 1976) findes en ganske grundig floraliste fra Katstrup skov, (Bromølle Skov), som er baseret på gamle floralister fra især 1940-50'erne, men rigtig mange arter går igen fra dengang. Her nævnes bl.a. arten Finger-Star, der regnes for regionalt Næsten Truet (NT) hos Leth (2006). Vi er opmærksomme på artens tidligere forekomst i skoven, da den nu afdøde botaniker Niels Faurholt omkring 2010 fortalte os om fund af Finger-Star i den sydøstlige del af skoven, men vi har ikke fundet den endnu.



Figur 10. Hylster-Guldstjerne fra Bromølle Skov. En "Ualmindelig Positiv-art", som vi har fundet i alle de tre foreløbigt omtalte skove.

Gravesen (1976) nævner også orkidéerne Rederod og Ægbladet Fliglæbe. Faktisk er Rederod set i Delhoved Skov så sent som i 2020 af Gerth Nielsen og CC, så arten findes i området, men den holder ofte til i mørke dele af skoven, da den klarer sig helt uden sollys, så den er svær at finde. Peter Leth nævner Skov-Gøgelilje i Bromølle Skov fra 2017 i FugleogNatur.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Guldnelde	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Bleg Star	UP
Druemunke	UP
Dynd-Padderok	AP
Firblad	UP
Gul Anemone	HP
Gul Frøstjerne	AP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Star	AP
Kantet Perikon	AP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Lådden Perikon	SP

Mark-Frytle	AP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Næb-Star	AP
Sanikel	SP
Sildig Skov-Hejre	UP
Skavgræs	SP
Skovbyg	HP
Skov-Hundegræs	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skov-Kogleaks	HP
Skov-Padderok	AP
Sump-Forglemmigej	AP
Sydlig Lund-Fladstjerne	HP
Top-Star	AP
Vandkarse	UP
Vand-Mynte	AP
Vellugtende Agermåne	SP

Tabel 3. Positiv-arter fra Bromølle Skov

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

I alt 41 positiv-arter er mange, og listen tæller rigtig mange af de samme arter som i Stenhusvænge Nord. Manglende fund i år af de 3-4 orkideer nævnt ovenfor skal ikke udelukke, at de i andre år igen kan dukke op i skoven. Bromølle Skov anser vi for en meget vigtig skov på Katstrup Gods.

Samlet om Bromølle skov:

Urter:	163
Træer og buske:	46
I alt:	209

Nationalt Røddlistede:	0
Regionalt Røddlistede:	3
Positiv-arter:	41
Godt undersøgt	5-6 besøg


Eskemose (Askevad Skov)

Eskemose ligger syd for Stenhusvænge. På målebordsblade hedder skoven Eskemose, men på Katstrup Gods' skovkort hedder den Askevad Skov.

Skoven er overvejende en løvskov og hovedsagelig beplantet af ret unge egetræer. Men der er også bøgetræer af noget ældre oprindelse, og især er der en bemærkelsesværdig bevoksning for enden af vejen, der fører ind i skoven, da bøgetræerne her er mægtige. De blev plantet i 1869. Midt i skoven er der en stor åben mose markeret med brunt på skovkortet, (se figur 12). Dybe drækanaler fører ned imod det lave terræn, og drækanalerne gennemskærer mosen. Nogle af kanalerne har åbent vand med masser af Vandrøllike. I centrum af mosen står en del yngre elletræer. Noget af mosen er våd eng, hvor Eng-Rævehale dominerer sammen med en del Eng-Nellikerod, i kanten er der Kær-Star, Krybende Læbeløs og Eng-Kabbeleje. Mod nord ses en stor star-sump. De våde og lysåbne arealer slås tilsyneladende.

Vandet løber under Hallebyorevej og videre til Lille Åmose og Øvre Halleby Å. Hvis de dybe drængrøfter stoppes i forbindelse med, at Katstrup Vildnis virkeliggøres, vil en stor del af Eskemose måske blive til sø.

Ud mod Hallebyorevej domineres skovbunden af Hvid Anemone. Det er en rig muldbund med en del Hulrodet Lærkespore, Gul Anemone og Alm. Lungeurt. De unge ege lader meget lys passere ned på skovbunden. Nær bebyggelser står mange haveflygtninge som Erantis og Vintergæk, Dansk Arum, Påske- og Pinselilje, Tulipan, Høst-Tidløs, Italiensk Skilla, Kejserkrone, Kærmindesøster, Perle-Hyacint.



Figur 11. Hulrodet Lærkespore.



Figur 12. Eskemosens centrale del set fra nord og på et sted, hvor mosen er smallest. I forgrunden et engstykke og et sølehul. Bemærk en del træruiner i baggrunden.

Arterne i Eskemose

Der er ingen nationale eller regionale rødlistearter i skoven, men som nævnt mange forårs-arter i den gode muldjord samt en del vådbunds-arter. Dette afspejles i tabellen herunder om positiv-arter. Det skal også siges, at vi kun har besøgt Eskemosen få gange og senest d. 28-4-21.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Angelik	AP
Alm. Guldnælde	AP
Alm. Lungeurt	HP
Dansk Arum	SP
Eng-Nellikerod	AP
Gul Anemone	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Kær-Star	AP

Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Skov-Hundegræs	HP

Tabel 4. Positiv-arter fra Eskemose

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

SP: Sjælden positiv-art



Figur 13. Eskemosen i april 2021, Hvid Anemone iblandet en del Hulrodetet Lærkespore.

Samlet om Eskemose:

Urter:	78
Træer og buske:	29
I alt:	107

Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	13
Dårligt undersøgt	3 besøg

Hollænderhaven

Hollænderhaven er et mindre skovstykke, der strækker sig fra Stenhusvænge Syd op til Kattrup Gods. Det mest bemærkelsesværdige er nok bøgebevoksningen på et højtliggende parti op mod Kattrup Gods. De høje, gamle bøge er plantet i 1837. Terrænet falder brat ned mod et vådere parti. Skovbrynene er her som mange andre steder i Kattrups skove præget af vældige, enkeltstående træer, f.eks. af et par mægtige Fuglekirsebær-træer i skovbrynet mod sydvest og andre store træer i det nordøstlige skovbryn.

Forårsfloraen består mest af Hvid Anemone, og der er enkelte Blå Anemone og Hylster-Guldstjerne mod nordøst. Et enkelt sted så vi også Desmerurt. Floralisten er kort, da vi kun har været i skoven 1-2 gange gennem april.

Arterne i Hollænderhaven

Grundet de få besøg er artslisten beskeden. Ikke desto mindre, så er der adskillige positiv-arter.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Alm. Guldnelde	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Blå Anemone	HP
Desmerurt	AP
Gul Anemone	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Skovbyg	HP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Skov-Hundegræs	HP

Tabel 5. Positiv-arter fra Hollænderhaven

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

Samlet om Hollænderhaven:

Urter:	49
Træer og buske:	29
I alt:	78
Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	13
Dårligt undersøgt	3 besøg

Møllervænge

Møllervænge med Ellehusvænge er ifølge Trap (1954) på 54 ha. Skoven har form som en trekant, og Åmose Å løber langs skovens østlige og nordlige side og munder ud i Strids Møllesø i skovens nordvestlige hjørne.

Der er store engområder langs Åmose Å mod øst, og hist og her er der elle-sumpe langs åen mod nord og mod vest (Storkemose) og i selve skoven øst for Storkemose i en dyb dalsænkning, hvor der også er en stor star-mose.

Selve skoven er hovedsagelig bøgeskov og egeskov, der er også partier med nåleskov af Rød-Gran, Nobilis, Douglasgran og Lærk.

Den nordlige del af skoven indgår i Natura 2000-området nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken. Mod nord er skoven kortlagt som EU-naturtypen "Elle- og Askeskove ved vandløb, søer og væld". Det er en EU-naturtype, som EU prioriterer at beskytte. Natura 2000-området strækker sig i øvrigt langs hele Åmose Å, der er således også områder af Stenhusvænge og større dele af Bromølle Skov, som er EU-naturområde, og dele af dette langs Åmose Å er den prioriterede naturtype "Elle- og Askeskov". Hele Natura 2000-området er også en del af Naturpark Åmosen. Et mindre område nær Ellehusvej er "Kattrup Skovbegravelsesplads", som er placeret i en ældre, moden bøgeskov.

Forårsfloraen domineres af Hvid Anemone, der er en del Gul Anemone og lidt Blå Anemone. På områder med god muldbund ses arter som Alm. Guldnelde, Alm.- og Hylster-Guldstjerne, Alm. Lungeurt, Firblad, Hulrodet- og Liden Lærkespore, Krat- samt Skov-Viol. På de mere sandede partier ses morbundsarterne Majblomst og Skovsyre. På de vådere partier er der Alm. Milturt og Eng-Kabbeleje. Også Desmerurt (få eksemplarer) fandt vi samt Skov-Padderok mod sydvest, og i en

egebevoksning mod sydøst står den regionalt sårbare Tandrod i mængde (rødlistestatus: VU). Tandrod (figur 14) findes kun to andre steder i Vestsjællands gamle amt, nemlig på Røsnæsspidsen og nær Sorø (Leth, 2006).



Figur 14. Tandrod. En regionalt rødlistet art i Vestsjælland. Tandrod kendes bl.a. på de mørkviolette yngleknopper i bladhjørnerne. Nederst th. ses Stor Fladstjerne.



Figur 15. Parti fra Møllervænge. Åmose Å th. tæt ved det sted, hvor åen skifter retning fra nord- til vestgående. Det store bøgetræ tv. er flækket i toppen og døende, og der ligger meget dødt ved i skovbunden, hvilket også er et udtryk for stedets vildhed. CC går langs åen.

Arterne i Møllervænge

Vi fandt 190 urter og 48 træer og buske, i alt 238 arter. Det er et stort antal arter, og det varierede terræn med en del våde naturtyper bidrager til det høje arts-antal, tilmed er skoven stor.

Her er en enkelt Regionalt Rødlistet art, nemlig Tandrod, som er regionalt sårbar (VU). Orkidéen Skov-Hullæbe står i større mængde langs skovvejen ifølge CC d. 22. 08. 2021. Antallet af positiv-arter er også højt, 42 arter, hvilket ses herunder.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Guldnelde	AP
Alm. Hvene	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Alm. Pimpinelle	AP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Blå Anemone	HP
Bølget Bunke	AP
Desmerurt	AP
Dunet Dueurt	AP
Dynd-Padderok	AP
Eng-Nellikerod	AP
Firblad	UP
Glat Løvefod	HP
Gul Anemone	HP
Gul Frøstjerne	AP
Hulrodet Lærkespor	AP
Hundekvik	UP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Høgeurt	AP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP

Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespor	HP
Læge-Ærenpris	HP
Lådden Perikon	SP
Mark-Frytle	AP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Skavgræs	SP
Skovbyg	HP
Skov-Fladbælg	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skov-Hundegræs	HP
Skov-Kogleaks	HP
Skov-Padderok	AP
Stiv Star	AP
Sydlig Lund-Fladstjerne	AP
Vandkarse	UP
Vand-Mynte	AP
Vandnavle	AP

Tabel 6. Positiv-arter fra Møllervænge

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

I Møllervænget ses to arter, som er indført til Danmark i starten af 1800-tallet: Rank Surkløver står i massevis langs skovvejen, samt Høj Skjolddrager, en meget sjælden plante, der har forvildet sig til skove og parker (Hartvig 2015).

En i Danmark hjemmehørende plante er Klatrende Lærkespor, der har en pletvis udbredelse, og på Sjælland findes den i NØ-Sjælland og i Åmosen, bl.a. her i Møllervænge samt i Trustrup Skov.

Os bekendt findes der meget lidt botanisk litteratur om Møllervænge. Gravesen (1976) nævner kun ganske få og almindelige arter fra denne vigtige skov, og han henviser til en floraliste fra 1936. På FugleogNatur nævnes Skov-Vikke (SP) flere gange fra 2012 og 2018, den har vi ikke set endnu.

Samlet om Møllervænge:

Urter:	190
Træer og buske:	48
I alt:	238
Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	42
Godt undersøgt	5-7 besøg

Trustrup Skov

Ifølge Gravesen (1976) er skoven på 54 ha på bakket terræn. Jordbunden er sandblandet ler med muldpræg. Skovkortet viser, at det overvejende er en løvskov og mest med Bøg og Ahorn. Der er også en del nåleskov midt i skoven samt en del store Eg og Ask. Der er gamle bøgeskovspartier mod SØ (plantet 1894) og hvor skoven er smallest (plantet i 1864). Ellers er der meget nyplantet, bl.a. eg og pyntegrønt m.v.. Som i de øvrige skove, vi undersøger, er der også her en del store sten, stendiger, vådområder og mindre vandløb, til gengæld er der ikke så mange træ-ruiner.

For få år siden var her en større koloni af Fiskehejre, som havde reder i trækronerne på et mindre område i skovens sydlige del. Desværre er træerne blevet fældet, men måske fuglene igen kan slå sig ned i skoven. En forladt ørnerede tyder på, at Havørnen måske har ynglet her?

Trustrup Skov blev tidligere ejet af Trustrup gård, og overgik til Katstrup gods i 2020 sammen med den store eng, "Flodholm", der grænser ned til Øvre Halleby Å.

Arterne i Trustrup Skov

Antallet af arter er indtil videre det højeste, vi har fundet i skovene, med 248 urter og 60 træer og buske, i alt 308 arter, her iblandt hele 52 positiv-arter.

Gravesen (1976) nævner en del arter kendt fra de øvrige skove her i rapporten samt orkidéen Tyndakset Gøgeurt og FugleogNatur nævner Vår-Fladbælg (Regional sårbar) fra 2019, disse 2 arter har vi endnu ikke fundet.

Positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Akselbomstret Star	AP
Alm. Fredløs	AP
Alm. Guldnaelde	AP
Alm. Hvene	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Bredbladet Klokke	SP
Bølget Bunke	AP
Dansk Arum	SP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Dunet Dueurt	AP
Dynd-Padderok	AP
Firblad	UP
Forskelligfarvet Forglemmigej	HP
Gul Anemone	HP
Hare-Kløver	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hundekvik	UP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Kamgræs	AP
Kantet Perikon	AP
Klæbrig Hønsetarm	UP
Kransbørste	AP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Lådden Perikon	SP

Mangeblomstret Frytle	AP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Sanikel	SP
Sildig Skov-Hejre	UP
Skovbyg	HP
Skov-Fladbælg	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skov-Hundegræs	HP
Skov-Kogleaks	HP
Stor Knopurt	AP
Sydlig Lund-Fladstjerne	HP
Tidlig Skov-Hejre	SP
Tyakset Star	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vandrøllike	AP
Vellugtende Gulaks	AP
Ægbladet Fliglæbe	UP
Æble-Rose	AP
Øret Pil	HP

Tabel 7. Positiv-arter fra Trustrup Skov

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

Samlet om Trustrup Skov:


Urter:	248
Træer og buske:	60
I alt:	308
Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	52
Godt undersøgt	8

Tætblomstret Hullæbe

Tætblomstret Hullæbe er en skov-orkidé, som findes sjældent til ret sjældent i morænelers-områder i Østjylland mellem Vejle og Randers. Desuden findes den i Danmark kun på Fyn ved Middelfart og i Vestsjælland syd for Jyderup samt på et nyt fundsted på Falster (Hartvig 2015). De vestsjællandske fund ligger næsten alle på Kattrup Gods arealer. Her står de meget fåtalligt og spredt og med forekomsten i Stenhusvænge som den absolut vigtigste.

Skovvejen fra "Sommerlyst" mod øst gennem Stenhusvænge er således helt central for denne sjældne orkidé. Tætblomstret Hullæbe vokser i gamle, bakkede og kilderige bøgeskove på plastisk ler. Den er snævert bundet til eocænt plastisk ler, og vokser i meget gamle skove, hvor der har været skovkontinuitet gennem sikkert mere end 500 år (Løjtnant og Ærenlund Pedersen 2016).

Siden 1980 har meldinger om fund af Tætblomstret Hullæbe spøgt på Jyderup-egnen, og i 1991 blev den fundet på 3 forskellige steder (Wind og Faurholdt, 1992). Vi har kendskab til voksestederne fra 2011 vist herunder på kortet:



Figur 16. Forekomster af Tætblomstret Hullæbe på og nær Kattrup Gods.

Den centrale forekomst er som sagt skovvejen, der er tegnet op med rødt. De øvrige nærliggende forekomster består i ret få eksemplarer Udenfor kortet er der 1 forekomst i Lille Møsten fra 1991, 1 fra Dyrehaven nord for Skarresø angivet fra 2010 samt 1 fra Jyderup Skov fra 1958-60. Alle disse fund er nævnt i Nielsen og Christiansen (2012).

Endvidere er der fund (2 stk.) fra "Den grønne sti" ovenfor "Helvedes kedel", senest i 2021.

På skovvejen fra "Sommerlyst" er Tæt blomstret Hullæbe optalt siden 1997 på et nærmere angivet tællefelt, der strækker sig fra lige efter "Sommerlyst" og til vejgaffel 155 m længere mod nordøst. Dette tællefelt indgår i DCEs "Overvågning af danske orkideer", Aarhus Universitet. Tællefeltet blev oprettet af Erik Jensen, Jyderup, i 1997, hvor han talte 37 skud og 50 skud i 1998. Erik Jensen har talt indtil 2007, men tallene er ikke tilgængelige for tiden på DMUs hjemmeside. Vi har en orkidé-note fra Niels Faurholdt fra 1993, som vi mener dækker det samme tællefelt, og han talte 29 skud.

(DMU står for Danmarks Miljø Undersøgelser og erstattes fremover af DCE, der står for National Center for Miljø og Energi).

På tabellen herunder kan man se tællingerne fra 2010, og i højre kolonne er vist optællinger fra vejgaffelen og videre mod "Edelsminde" til man når udenfor skoven. Der har næsten altid været flere Tæt blomstret Hullæbe på denne strækning end på DMUs tællefelt.

Årstal	DMU tællefelt Blomstrende skud	Tællere	Strækning mod NØ Blomstrende skud
2010	23	GN+HGC	?
2011	29	HGC+GN	?
2012	10	HGC+GN	18
2013	13	HGC+GN	23
2014	8	HGC+GN	11
2015	9	HGC+GN+CC	11
2016	5	HGC+GN+CC	33
2017	6	HGC+CC	12
2018	6	HGC+CC	31
2019	5	HGC+CC	10
2020	0	HGC+CC	0
2021	8	HGC+CC	7

Tabel 1. Antal blomstrende skud af Tæt blomstret Hullæbe i Stenhusvænge.

Tællere: CC: Carsten Clausen, HGC: Hans Guldager Christiansen, GN: Gerth Nielsen.

Tallene taler deres tydelige sprog: Det går tilbage med Tæt blomstret Hullæbe i Stenhusvænge. Vi kender til en enkelt trussel, som har taget livet af adskillige Hullæber, nemlig det, at vejsiden har været brugt til at lægge fældede stammer på.

Men det kan næppe være hele forklaringen. En kendt trussel er også, at rådyr holder af at nippe blomsterakset af skuddene, de smager givetvis sødt. Vi ser altid en del afbidte skud af Tæt blomstret Hullæbe i Stenhusvænge.

Året 2020 var katastrofalt. Peter Wind fra DCE fortalte, at det også var et katastrofeår for Tæt blomstret Hullæbe i Jylland, så der kan være tale om klimamæssige forhold, men vi ved det ikke.

Lykkeligvis dukkede Tæt blomstret Hullæbe op igen i 2021.



Figur 17. Tæt blomstret Hullæbe mellem bøgestammer.

DCE-tællefelt Bromølle Skov

Der er også et DCE-tællefelt i Bromølle Skov lige syd for Bromølle Kro, hvor Kattrupvej begynder. Feltet er placeret i vejrabatten mellem vejen og skoven udenfor hegnet.

Årstal	Antal	Årstal	Antal
2010:	6	2016:	2
2011:	9	2017:	3
2012:	10	2018:	0
2013:	6	2019:	0
2014:	0	2020:	0
2015:	5	2021:	0

Tabel 2. Antal Tæt blomstret Hullæbe ved Bromølle kro

Tendensen er her den samme som ved Stenhusvænge prøvefeltet. Men denne lokalitet er langt mere udsat mht. skygge, klipning af skovbrynet, uro, slåning. Så det skal overvejes at nedlægge feltet.

Afslutning og plan for 2022

Hvis alt går vel, har vi i 2022 tænkt os at undersøge Hejrebjerg skov, Højbjerg Skov syd for Kattrupvej, og arbejdet fra 2021 kan evt. suppleres.

Tak til Anders og Iben Møller fordi vi har fået lov til at færdes frit i skovene, hvilket forhåbentlig har bevirket, at der er kommet en hel del planter på floralisterne, som ellers ikke ville have været med. Også tak til Anne Bronée for værdifuld hjælp med udfærdigelsen af denne rapport.

Litteratur

Christiansen, Hans Guldager, Carsten Clausen og Peter Leth 2017: Naturpark Åmosens vilde orkidéer.

Gravesen, Palle 1976: Oversigt over botaniske lokaliteter 1. Sjælland. – Fredningsstyrelsen.

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. – Gyldendal.

Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006. På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.

Løjtnant, Bernt og Henrik Ærenlund Pedersen 2016: Én orchidé – mange kunstneriske Udtryk. – BFN's Forlag.

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens Flora. – Gyldendal. Oversat til dansk og bearbejdet af Jon Feilberg.

Nielsen Gerth og Hans Guldager Christiansen, 2012: Tæt blomstret Hullæbe (*Epipactis purpurata*) på Sjælland. – Upubliceret.

Skov- og Naturstyrelsen 2000: Danske Naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk.- Miljø- og Energiministeriet / Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen 2000: Nøglebiotoper, skov – billedkatalog. Tekst af Hanne Hübertz, Lene Pedersen og Flemming Rune. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Wind, Peter og Niels Faurholdt 1992: Fund af Tæt blomstret Hullæbe (*Epipactis purpurata*) på Sjælland. – URT 1992. 1 pp. 9-16.

På de følgende sider ses de samlede flora-lister mv. fra alle de omtalte skovafsnit.

Stenhusvænge

Nord

Ager-Tidsel
Akselblomstret Star
Alm. Bingelurt
Alm. Brunelle, også
hvide
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Gåsemad
Alm. Hulsøv
Alm. Hundegræs
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Milturt
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Vej-Pileurt
Akeleje
Angelik
Bidende Pileurt
Bidende Ranunkel
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Ærenpris
Blå Anemone
Bredbladet
Dunhammer
Bredbladet
Mangeløv
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Dag-Pragtstjerne
Dansk Arum
Desmerurt
Druemunke
Dunet Dueurt
Dunet Steffensurt
Dynd-Padderok
Enblomstret
Flitteraks
Engelsød
Engkarse
Eng-Nellikerod
Eng-Rævehale
Erantis
Feber-Nellikerod

Firblad
Fløjlsgræs
Foder-Kulsukker
Følfod
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Gul Anemone
Gul Iris
Gråbynke
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Hulrodet
Lærkespore
Humle-Sneglebælg
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvidkløver
Hylster-Guldstjerne
Høj Sødgræs
Håret Frytle
Håret Star
Japansk Pileurt
Kattehale
Knoldet Brunrod
Knold-Ranunkel
Korsknop
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Potentil
Krybende Læbeløs
Kryb-Hvene
Kær-Galtetand
Kær-Star
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Liden Lærkespore
Liden Singrøn
Lund-Rapgræs
Lyse-Siv
Løgkarse
Lådden Dueurt
Majblomst
Manna-Sødgræs
Mark-Forglemmigej

Marts-Viol
Mellembrodt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Mælkebøtte sp.
Nyreblandet
Ranunkel
Nælde-Klokke
Pengebladet Fredløs
Pille-Star
Prikbladet Perikon
Påskelilje
Rejnfan
Ris-Dueurt
Roset-Sprinklap
Ru Svinemælk
Rød Hestehov
Rørgræs
Sildig Skov-Hejre
Skavgræs
Skovarve
Skov-Burre
Skovbyg
Skov-Galtetand
Skov-Gøgeliije
Skov-Hundegræs
Skov-Hullæbe
Skovmærke
Skov-Padderok
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skovsyre
Skov-Viol
Skvalderkål
Smalbladet
Dunhammer
Smalbladet
Mangeløv
Småblomstret
Balsamin
Småkronet
Gedeskæg
Spring-Balsamin
Stinkende
Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde

Sump-Forglemmigej
Svine-Mælde
Sværtvæld
Sydlig Lund-
Fladstjerne
Sæbeurt
Tagrør
Tofrøet-Vikke
Tusindfryd
Tykbladet Ærenpris
Tyndakset Gøgeurt
Tæt blomstret
Hullæbe
Vand-Mynte
Vandrøllike
Vild Kørvel
Vintergæk
Vorterod
Ægbladet Fliglæbe

Træer/buske

Ahorn
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Røn
Alm. Vedbend
Alm. Gedeblad
Alm. Skovranke
Ask
Bittersød Natskygge
Brombær sp.
Bøg
Douglasgran
Dun-Birk
Fuglekirsebær
Grå-Pil
Hindbær
Humle
Korbær
Kристtorn
Lærk sp.
Nordmannsgran
Pebertræ
Rødgran
Rød-El
Selje-Pil
Selje-Røn
Sitka-Gran
Skov-Elm
Skov-Fyr

Slåen
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Thuja sp.
Vorte-Birk

Fugle

Bogfinke
Fasan
Gransanger
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gulspurv
Gærdesmutte
Halemejse
Havørn
Hvid Vipstjert
Musvit
Muskvæge
Ravn
Rødhals
Skovskade
Skovspurv
Solsort
Sporvehøg
Spætmejse
Stillits
Stor Flagspætte
Stor Skallesluger
Træløber

Andet

Aurora
Blåbåndet
Pragtvandnymfe
Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Skovrandøje
Stor Kålsommerfugl

Brun frø sp.
Egern
Markfirben
Rådyr
Vinbjergsnegl

Stenhusvænge syd

Aften-Pragtstjerne
Ager-Tidsel
Akselblomstret Star
Alm. Bingelurt
Alm. Brunelle
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldstjerne
Alm. Hulsøb
Alm. Hundegræs
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Milturt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Vej-Pileurt
Bidende Pileurt
Bidende Ranunkel
Blå Anemone
Bredbladet Dunhammer
Bredbladet Mangeløv
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Canadisk Bakkestjerne
Dunet Steffensurt
Dynd-Padderok
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Eng-Kabbleje
Eng-Nellikerod
Eng-Rævehale
Enårig Rapgræs
Feber-Nellikerod
Firblad
Fladkravet Kodriver
Foder-Kulsukker
Følfod
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Gold Hejre
Gråbynke
Gul Anemone
Gul Frøstjerne
Gul Iris
Gærde-Vikke
Haremad
Horse-Tidsel
Hulrodet Lærkespore
Humle-Sneglebælg
Hvas Randfrø

Hvid Anemone
Hvid Kløver
Hvis Stenkløver
Hylster-Guldstjerne
Håret Frytle
Knoldet Brunrod
Korsknap
Kost-Fuglemælk
Krat-Viol
Krat-Ærenpris
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kær-Star
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lav Ranunkel
Liden Lærkespore
Lund-Rapgræs
Lyse-Siv
Løgekarse
Lådden Dueurt
Lådden Perikon
Majblomst
Mellebrudt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Mælkebøtte sp.
Nyrebladet Ranunkel
Nælde-Klokke
Opret Hønsetarm
Pengebladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Rejnfan
Ris-Dueurt
Roset-Springklap
Ru Svinemælk
Rød Tvetand
Sanikel
Sildig Skov-Hejre
Skarvgræs
Skov-Brandbæger
Skovbyg
Skov-Galtetand
Skov-Hullæbe
Skov-Hundegræs
Skovmærke
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star

Skov-Stilkaks
Skovsyre
Skov-Viol
Smalbladet Mangeløv
Småkronet Gedeskæg
Spring-Balsamin
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Stor Nælde
Svaleurt
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sød Astragal
Sødskaerm
Tagrør
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Tykbladet Ærenpris
Tyndakset Gøgeurt
Tæt blomstret Hullæbe
Vandkarse
Vand-Mynte
Vandrøllike
Vellugtende Agermåne
Vild Kørvel
Vild Løg
Vorterod
Æglbladet Fliglæbe

Træer/buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Røn
Ask
Benved
Brombær sp.
Bøg
Drue-Hyld
Dun-Birk
Fuglekirsebær
Glat Hunderose
Grå-El
Grå-Pil
Hassel
Hindbær
Humle

Hvid Kornel
Korbær
Kristtorn
Kvalkved
Lærk
Mahonie
Pebertræ
Rød-El
Rødgran
Rød Snebær
Sitkagran
Skov-Elm
Slåen
Solbær
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Vild Ribs
Vorte-Birk

Fugle

Blishøne
Fasan
Gråand
Grågå
Grå Krage
Gråstrubet Lappedykker
Gærdesmutte
Hvid Vipstjert
Landsvale
Lille Lappedykker
Musvit
Natugle
Ravn
Rød Glente
Rødhals
Solsort
Stor Flagspætte

Andet

Aurora
Grøn frø (hørt)
Kronstyr (spor)
Rådyr
Vinbjergsnegl
Voldsnegl

Bromølle Skov

Aften-Pragtstjerne
Ager-Padderok
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Akselblomstret Star
Alm. Bingelurt
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnælde
Alm. Guldstjerne
Alm. Hanekro
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hønsetarm
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Milturt
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Svinemælk
Alm. Vej-Pileurt
Angelik
Bidente Pileurt
Bidente Ranunkel
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Ærenpris
Bredbladet
Dunhammer
Bleggul Snerre
Bleg-Star
Blære-Star
Bredbladet Mangeløv
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Bølget Bunke
Cikorie
Citronmelisse
Dag-Pragtstjerne
Druemunke
Dunet Steffensurt
Dynd-Padderok
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Eng-Nellikerod
Eng-Rapgræs
Eng-Rottehale
Eng-Rævehale
Feber-Nellikerod
Firblad
Foder-Kulsukker
Følfo
Gederams
Glat Vejbred
Gråbynke
Gul Anemone
Gul Fladbælg
Gul Frøstjerne
Gul Iris
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Haremad
Horse-Tidsel

Hulkravet Kodriver
Humle-Sneglebælg
Hundepersille, sp.
Hulrodet Lærkespore
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvid Hestehov
Hvidkløver
Hvid Snerre
Hylster-Guldstjerne
Håret Frytle
Håret Star
Kantet Perikon
Knoldet Brunrod
Knop-Siv
Korsknep
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Læbeløs
Kær-Star
Kær-Svinemælk
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Liden Lærkespore
Lyse-Siv
Læge-Ærenpris
Løgekarse
Lådden Perikon
Mark-Forglemmigej
Mark-Frytle
Marts-Viol
Mellembrodt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Mælkebøtte sp.
Nyrebladet Ranunkel
Næb-Star
Nælde-Klokke
Pastinak
Pengebladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Påskelilje
Ru Svinemælk
Rørgræs
Sanikel
Sildig Skov-Hejre
Skavgræs
Skovarve
Skov-Burre
Skovbyg
Skov-Fladbælg
Skov-Galtetand
Skov-Hullæbe
Skov-Hundegræs
Skov-Jordbær
Skov-Kogleaks
Skov-Mærke
Skov-Padderok
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skovsyre

Skov-Viol
Skvalderkål
Smalbladet Mangeløv
Småblomstret
Balsamin
Snerle-Pileurt
Spring-Balsamin
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Storrodet Storkenæb
Sump-Forglemmigej
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sød Astragal
Tagrør
Top-Star
Tveskægget Ærenpris
Tæt blomstret Hullæbe
Vandkarse
Vand-Mynte
Vedbend-Ærenpris
Vellugtende Agermåne
Vild Kørvel
Vild Løg
Vild Tulipan
Vintergæk
Vorterod
Vår-Fladbælg

Træer&buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Liguster
Alm. Røn
Alm. Snebær
Ask
Benved
Brombær sp.
Bøg
Bånd-Pil
Douglas-Gran
Dunet Gedeblad
Engriflet Hvidtjørn
Femhannet Pil
Fuglekirsebær
Grå-El
Grå-Pil
Hassel
Hestekastanje
Hindbær
Humle
Hvid Kornel
Hybrid Lærk
Korbær
Mirabel
Navr
Nordmannsgran
Ribs, s.p.
Rynket Rose
Rødgran
Rød Kornel
Selje-Pil

Selje-Røn
Skov-Elm
Skov-Æble
Sitka-Gran
Skov-Elm
Spids-Løn
Slåen
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Vinter-Eg
Vorte-Birk

Fugle

Blishøne
Blåmejse
Bogfinke
Gransanger
Gråand
Gærdesmutte
Gøg
Havesanger
Musvit
Ravn
Ringdue
Rødhals
Sangdrossel
Skovskade
Solsort
Spætmejse
Stor Flagspætte

Andet

Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Det Hvide C
Nældens Takvinge
Okkergul Randøje

Blåbåndet
Pragtvandnymfe
Stor Humleflue
Vinbjergsnegl
Rådyr

Eskemose

Ager-Tidsel
Angelik
Alm. Bingelurt
Alm. Bjørneklo
Alm. Brunelle
Alm. Engelsød
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Hundegræs
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Mjødurt
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Dansk Arum
Døvnælde
Eng-Kabbeleje
Eng-Nellikerod
Eng-Rapgræs
Eng-Rævehale
Erantis
Feber-Nellikerod
Følfod
Glat Vejbred
Gråbynke
Gul Anemone
Gul Iris
Gærde-Kartebolle
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Have-Påskelilje
Have-Tulipan
Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore
Hvid Anemone
Høst-Tidløs
Italiensk Skilla
Japansk Pileurt
Kejserkrone
Knoldet Brunrod
Korsknap
Krat-Viol
Kruset Skræppe
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil
Kærmindesøster
Kær-Star
Kål-Tidsel
Lav Ranunkel
Liden Lærkespore
Liden Singrøn
Lyse-Siv
Læge-Ærenpris
Løgkarse
Marts-Viol
Mælkebøtte sp.
Opret Hønsetarm
Perlehyacint
Pinselilje
Prikbladet Perikon
Rejnfan
Russisk Skilla
Skov-Galtetand
Skov-Hundegræs
Skovmærke
Skov-Star
Skov-Viol

Skvalderkål
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Nælde
Stor Konval
Sødsøkær
Tagrør
Vedbend-Ærenpris
Vild Kørvel
Vintergæk
Vorterod

Træer/buske

Ahorn
Alm. Hæg
Alm. Snebær
Ask
Benved
Brombær sp.
Bøg
Dun-Birk
Engriflet Tjørn
Fjeld-Ribs
Fuglekirsebær
Glat Hunderose
Hassel
Hindbær
Humle
Mahonie
Mirabel
Navr
Rød-El
Rødgran
Skov-Elm
Slåen
Stilk-Eg
Storbladet Lind
Syren
Vedbend
Vild Ribs

Fugle

Blåmejse
Bogfinke
Fasan
Gransanger
Grågå
Grå Krage
Gærdesmutte
Husskade
Hvid Vipstjert
Munk
Musvit
Ravn
Rød Glente
Rødhals
Skovspurv
Solsort
Stor Flagspætte

Andet

Aurora
Dagpåfugleøje
Lille Kålsommerfugl
Skovrandøje
Hare

Hollænderhaven

Ager-Tidsel
Alm. Bingelurt
Alm. Brunelle
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Hulsøv
Alm. Hundegræs
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Milturt
Alm. Røllike
Alm. Torskemund
Blå Anemone
Burre-Snerre
Desmerurt
Enblomstret Flitteraks
Feber-Nellikerod
Gråbynke
Gul Anemone
Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore
Hvid Anemone
Hylster-Guldstjerne
Knoldet Brunrod
Korsknap
Krat-Viol
Løgkarse
Marts-Viol
Mælkebøtte sp.
Rødkløver
Rød Tvetand
Skovbyg
Skov-Galtetand
Skov-Hundegræs
Skovmærke
Skovsyre
Skvalderkål
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Tveskægget Ærenpris
Vedbend-Ærenpris
Vild Kørvel
Vintergæk
Vorterod

Træer/buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Røn
Ask
Brombær sp.
Bøg
Dun-Birk
Fuglekirsebær
Glat Hunderose
Grå-El
Hindbær
Humle
Hvid-Pil
Korbær

Mirabel
Nobilisgran
Nordmannsgran
Rød-El
Rødgran
Rød Kornel
Sitka-Gran
Skov-Elm
Slåen
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Vild Ribs

Fugle

Allike
Bogfinke
Gransanger
Grå Krage
Gærdesmutte
Solsort
Spætmejse
Stor Flagspætte

Møllervænge

Ager-Padderok
Ager-Tidsel
Akselblomstret Star
Alm. Bingelurt
Alm. Brunelle og hvide
Alm. Engelsød
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Gåsemad
Alm. Hanekro
Alm. Hulsøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvene
Alm. Hønsetarm
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Markarve
Alm. Milturt
Alm. Mjødurt
Alm. Pimpinelle
Alm. Rajgræs
Alm. Røllike
Alm. Sankthansurt
Alm. Syre
Alm. Vej-Pileurt
Angelik
Bidende Pileurt
Bjerg-Ærenpris
Bleggul Snerre
Blød Storkenæb
Blå Anemone
Bredbladet Mærke
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Bølget Bunke
Canadisk Gylidenris
Cikorie
Desmerurt
Draphavre
Dunet Dueurt
Dunet Steffensurt
Dusk-Syre
Dynd-Padderok
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Eng-Kabbeleje
Eng-Nellikerod
Eng-Rotthale
Eng-Rævehale
Enårig Rapgræs
Erantis
Feber-Nellikerod
Filtet Burre
Firblad
Fløjlsgræs
Følfo
Gederams
Glat Burre
Glat Løvefod
Glat Vejbred
Glat Ærenpris
Grønblomstret Bjørneklo
Gråbynke

Gul Anemone
Gul Fladbælg
Gul Frøstjerne
Gul Iris
Gul Kløver
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Haremad
Have-Påskelilje
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulrodet Lærkespore
Humle-Sneglebælg
Hundekvik
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvid Foldblad
Hvidkløver
Hvid Snerre
Hylster-Guldstjerne
Hyrdetaske
Høj Skjolddrager
Håret Frytle
Håret Høgeurt
Italiensk Arum
Italiensk Skilla
Japansk Pileurt
Klatrende Lærkespore
Kløftet Storkenæb
Knoldet Brunrod
Korsknep
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kæmpe-Bjørneklo
Kær-Star
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Lærkespore
Liden Singrøn
Liljekonval
Lyse-Siv
Læge-Ærenpris
Løgkarse
Lådden Dueurt
Lådden Perikon
Majblomst
Manna-Sødgræs
Mark-Forglemmigej
Mark-Frytle
Mark-Krageklo
Marts-Viol, også hvide
Matrem
Mellembrodt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nyrebladet Ranunkel
Nælde-Klokke
Pengebladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Rank Surkløver
Rejnfan

Ris-Dueurt
Roset-Springklap
Rød Hestehov
Rød Tvetand
Røgræs
Sildig Gylidenris
Skavgræs
Skive-Kamille
Skov-Brandbæger
Skov-Burre
Skovbyg
Skov-Fladbælg
Skov-Galtetand
Skov-Hullæbe
Skov-Hundegræs
Skov-Kogleaks
Skovmærke
Skov-Padderok
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skovsyre
Skov-Viol
Skvalderkål
Slangehoved
Smalbladet Mangeløv
Småblomstret Balsamin
Småkronet Gedeskæg
Snerle-Pileurt
Stinkende Storkenæb
Stiv-Star
Storbægret Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Stor Nælde
Svaleurt
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sød Astragel
Tagrør
Tandrod
Tofrøet Vikke
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Vandkarse
Vand-Mynte
Vandnavle
Vedbend-Ærenpris
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vinge-Pileurt
Vintergæk
Vorterod
Træer/buske
Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hyl
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hæg
Alm. Røn
Alm. Snebær
Ask
Benved
Bittersød Natskygge
Blod-Ribs
Brombær sp.
Bævreasp
Bøg

Dun-Birk
Fuglekirsebær
Grå-El
Grå-Pil
Grøn Douglasgran
Hassel
Hestekastanje
Hindbær
Humle
Hybrid Lærk
Japansk Lærk
Korbær
Kristtorn
Kæmpegran
Mirabel
Nobilisgran
Normannsgran
Selje-Pil
Selje-Røn
Skov-Elm
Skovranke
Skør-Pil
Slåen
Solbær
Stilk-Eg
Stikkelsbær
Rød-Eg
Rød-El
Rødgran
Rød Snebær
Thuja sp.
Valnød
Vild Ribs
Vorte-Birk
Fugle
Blishøne
Bogfinke
Fasan
Gransanger
Gråand
Grågå
Gråkrage
Gærdesmutte
Hvid Vipstjert
Løvsanger
Munk
Musvit
Musvåge
Ravn
Ringdue
Rødhals
Sangdrossel
Skovskade
Solsort
Spætmejs
Stor Flagspætte
Andet
Aurora
Dagpåfugleøje
Græsråndøje
Skovråndøje
Stor Bredpande
Vejråndøje

Stor Humleflue
Rådyr
Spidsmus (død)

Trustrup Skov

Aften-Pragtstjerne
Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Tidsel
Ager-Vejbred
Akselblomstret Star
Alm. Bingelurt
Alm. Bjørneklo
Alm. Brandbæger
Alm. Brunelle, også hvide
Alm. Firling
Alm. Fredløs
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Gåsemad
Alm. Hulsøvåb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvene
Alm. Hønsetarm
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Markarve
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Rødknæ
Alm. Røllike
Alm. Svinemælk
Alm. Syre
Alm. Torskemund
Alm. Vej-Pileurt
Alsike-Kløver
Angelik
Bidende Pileurt
Bitter Bakkestjerne
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Ærenpris
Bidende Ranunkel
Bleggul Snerre
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Bredbladet Dunhammer
Bredbladet Klokke
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Bølget Bunke
Canadisk Bakkestjerne
Canadisk Gylidenris
Cikorie
Dag-Pragtstjerne
Dansk Arum
Desmerurt
Draphavre
Druemunke
Dunet Dueurt
Dunet Steffensurt
Dusk-Syre
Dynd-Padderok
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Eng-Brandbæger
Eng-Forglemmigej
Eng-Rapgræs
Eng-Rottehale
Eng-Rævehale
Enårig Rapgræs
Feber-Nellikero
Filtet Burre
Fingerbøl
Firblad

Forskelligfarvet
Forglemmigej
Fløjlgræs
Foder-Vikke
Følfo
Gederams
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Gold Hejre
Grønblomstret Bjørneklo
Grøn Høgeskæg
Gråbynke
Gul Anemone
Gul Fladbælg
Gul Iris
Gul Kløver
Gul Snerre
Gærde-Snerle
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Hare-Kløver
Haremad
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulkravet
Kodriver
Hundekvik
Hulrodet Lærkespore
Humle-Sneglebælg
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvid Kløver
Hvidmelet Gåsefo
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Hylster Guldstjerne
Hyrdetaske
Høst-Borst
Høst-Rødtop
Håret Kortstråle
Kamgræs
Kantet Dueurt
Kantet Perikon
Kirtel Dueurt, hvid
Kirtel-Kortstråle
Klatrende Lærkespore
Klæbrig Hønsetarm
Kløftet Storkenæb
Knoldet Brunrod
Knold-Rottehale
Knop-Siv
Knutet Pileurt
Knæbøjet Rævehale
Korsknep
Kortkronet Gedeskæg
Kransbørste
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kugle-Museurt
Kæmpe Bjørneklo
Kæmpe-Svingel
Kær-Star
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Lærkespore
Liljekonval
Lyse-Siv
Læge-Ærenpris

Løgkarse
Lådden Dueurt
Lådden Perikon
Mangeblomstret Frytle
Mark-Forglemmigej
Mark-Ærenpris
Marts-Viol
Mellebrudt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Mørk Kongelys
Nyrebladet Ranunkel
Nælde-Klokke
Opret Hønsetarm
Pastinak
Plettet Arum
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Påskelilje
Rank Vejsennep
Rejnfan
Roset-Springklap
Ru Svinemælk
Rød Hestehov
Rød-Kløver
Rød Tandbæger
Rød Tvetand
Rørgræs
Sanikel
Sildig Gylidenris
Sildig Skov-Hejre
Skive-Kamille
Skovarve
Skov-Brandbæger
Skov-Burre
Skov-Byg
Skov-Fladbælg
Skov-Forglemmigej
Skov-Galtetand
Skov-Hanekro
Skov-Hullæbe
Skov-Hundegræs
Skov-Jordbær
Skov-Kogleaks
Skovmærke
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skov-Syre
Skov-Viol
Skvalderkål
Slangehoved
Smalbladet Vikke
Småblomstret Balsamin
Spidsbladet Vej-Pileurt
Spring-Balsamin
Stinkende Storkenæb
Storbægret Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Hundepersille
Stor Knopurt
Stor Konval
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Stor Væselhale
Sump-Evighedsblomst
Svaleurt
Svine-Mælde
Sværtevæld
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sød Astragal
Sødskærm
Tagrør

Tandfri Vårsalat
Tidlig Skov-Hejre
Tofrøet Vikke
Tornet Salat
Tudse-Siv
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Tykakset Star
Tykbladet Ærenpris
Udspærret Vinterkarse
Uldbladet Kongelys
Vedbend-Ærenpris
Vandrøllike
Vellugtende Gulaks
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Løg
Vinge-Pileurt
Vintergæk
Vorterod
Ægbladet Fliglæbe
Ørnebregne

Træer/Buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Røn
Alm. Skovranke
Alm. Æble
Ask
Balsam-Poppel
Benved
Bittersød Natskygge
Brombær sp.
Buketorn
Bævreasp
Bøg
Bånd-Pil
Drue-Hyld
Dun-Birk
Dunet Gedeblad
Engriflet Hvidtjørn
Forsythia
Fuglekirsebær
Glat Hunderose
Grå-Pil
Hassel
Hestekastanje
Hindbær
Humle
Hvid Kornel
Hybrid Lærk
Japansk Lærk
Korbær
Kvalkvæd
Mahonie
Mangeblomstret Rose
Mirabel
Navr
Nobilisgran
Rynket Rose
Rød- El
Rødgran
Rød Kornel
Selje-Pil
Selje-Røn
Sitka-Gran
Skov-Elm
Skov-Æble
Slåen
Spids-Løn
Stikkelsbær
Stilk-Eg

Syren
Thuja
Vedbend
Vinter-Eg
Vorte-Birk
Vrietorn
Æble-Rose
Ægte Kastanje
Øret Pil

Fugle
Blishøne
Blåmejse
Bogfinke
Grågås
Gråkrage
Gøg
Dompap

Fasan
Fiskehejre
Gulspurv
Gransanger
Grønirisk
Gærdesanger
Gærdesmutte
Huldue (hørt)
Hættemåge
Landsvale
Musvit
Nattergal
Ravn
Ringdue
Rød Glente
Rødhals
Rørdrum
Sangdrossel

Skarv
Skovskade
Skovsneppe
Solsort
Spætmejse
Stor Flagspætte
Trane

Andet
Admiral
Alm. Vandnymfe
Aurora
Blåbåndet Pragtvanymfe
Dag-Påfugleøje
Engrandøje
Græsråndøje
Grønåret Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl

Okkergul Randøje
Skovrandøje
Sortmåler
Stor Bredpande
Stor Humleflue
Stor Kålsommerfugl

Brun frø sp.
Grøn Frø
Ilder (?)
Judasøre
Ræv
Rød Hedelibel
Rådyr
Spidsmus, død
Spor af Krondyr
Stor Gedeheads
Vinbjergsnegl



Figur. 18 Hulkravet Kodriver

