

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG

Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen
2012, ny udgave 2025



Toppen af Ørnebjerg



Tyndakset Gøgeurt

INDLEDNING

Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset 73 m. høj overdrevsbakke beliggende ca. 500 m. nordøst for landsbyen Buerup, øst for Tissø. På bakken findes foruden et fint overdrev også nogle gode partier med vådområder og lidt skov.

Bakken er nok bedst kendt for sine fortidsminder, da der bl.a. findes stendiger, rillesten og flere stenkredse, hvis betydning er til stadig diskussion. Men bakken besøges også pga. den storslåede udsigt over Tissø og Lille Åmose

Vi har besøgt Ørnebjerg mange gange i 2009-2012 og har lavet floralister. Rapportens primære formål er at fortælle om floraen på Ørnebjerg, men stedets øvrige kvaliteter omtales også kort.

I de efterfølgende år har vi jævnligt besøgt området, og der er gjort flere fund af planter mv., hvilket har ført til denne ajourført rapport.

ØRNEBJERG – BELIGGENHED OG GEOLOGI




Figur 1. Buerups beliggenhed ca. 2 km nordøst for Tissø.

Buerup ligger ca. 2 km. nordøst for Tissø, se figur 1. Ørnebjerg ligger ca. 500 m. nordøst for kirken i Buerup, se figur 2.

Ørnebjerg ejes af Jeanette og Henrik Sørensen, Sønderød. Der er offentlig adgang til den fredede bakke, og man kan gå dertil af en marksti vest for ejendommen Lillevej 7.

Egnen nordøst for Tissø når for danske forhold anselige højder, og højest ved Kløveshøj (100 m.). Under sidste istids afsluttende faser trængte gletsjere frem og smeltede senere bort. Ole Humlum¹ skriver, at de afrundede bakkedrag i Vestsjælland kan opfattes "som ruiner af det landskab, der opstod ved det østjyske is-fremstød. Dette gælder bl.a. bakkepartiet Kløveshøj, der kan have været en stor randmorænebakke skabt i denne periode."

¹ Humlum, Ole 1983: Geologi. Vestsjællandske landskabsformer. Fredningsplanlægning. –Vestsjællands Amtskommune



Figur 2. Kort- og Matrikelstyrelsens 1:25.000 kort over Ørnebjerg.

Udsigten fra Ørnebjerg er så fantastisk flot, da bakken er en del af en randmoræne, og det omgivende landskab ligger lavere. Mod vest ligger Tissø, som er et kæmpemæssigt dødishul. Mod nord ligger Lille Åmose (se foto på forsiden), der oprindeligt er dannet som en tunneldal udformet af smeltevand, der løb under isen og gravede sig ned i underlaget.

Fortid og historie

På Ørnebjerg kan man se følgende spor fra de ældste tider:

1. Rillesten fra stenalderen
2. Stenkredse fra bronzealderen
3. Stævningsskov fra jernalderen og op til historisk tid
4. Overdrev med spor af tilstødende agre fra før udskiftningen omkring 1790.

Ifølge Lisbeth Pedersen (2005)² findes der højryggede agre fra middelalderen på Ørnebjerg. Disse svarer til "agre fra før udskiftningen" nævnt herover, og de ligger på bakkens nordøstside. Disse dele af overdrevet har således været dyrket, men sikkert ikke siden middelalderen.

Der findes tre rillesten på Ørnebjerg. Stenene og tolkningen af deres betydning omtales udførligt af Bent Frandsen³, og han behandler også Ørnebjergs stenkredse. Det skal nævnes, at der ikke er enighed om tolkningen af rillesten. Arkæologer opfatter rillerne som spor efter stenhuggeri, hvilket nok er det sandsynligste.

² Pedersen, Lisbeth 2005: Katalog over særlige og kulturmiljøer i og omkring Naturpark Åmosen-Tissø side 32 og 39. I: Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. – Styringsgruppe for Naturpark Åmosen-Tissø, Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet 2005.


³ Frandsen, Bent 2001: Træk af Høng Kommunes historie. – Høng Kommune.

Den arkæologiske sognebeskrivelse nævner 2 og måske flere stenkredse. Den omtaler en rund stensætning med 50 sten og med en diameter på 10 m.. Desuden en rund stensætning med diameter på 3 m.. Ifølge hjemmesiden nævnt side 3 findes der i alt 14 stenkredse på Ørnebjerg. Fem af dem er tydeligere end de øvrige. En stenkreds ses på foto på forsiden. Stenkredsene menes at være samlingssteder i bronzealderen for dyrkelse af solen. Der kan have været et sol-alter på toppen af Ørnebjerg.

Store dele af Ørnebjerg har næppe nogensinde været dyrket. De nævnte højryggede agre er en undtagelse, og arealerne sydvest for bakken ned mod indgangen til fredningen er stærkt gødningsprægede. Stævningsskoven vender vi tilbage til.

Landskabet i dag

Overdrevsbakken er heget af og det fredede areal (med rødt markeret) er på 6 ha. Der er tale om en frivillig fredning fra 1931 tinglyst af Greve A. P. Bernstorff Mylius og hustru, Kattrup gods. Fredningen nævner to stenkredse og de parallelle stenrækker på NØ-skråningen.



Figur 3. Kalundborg kommunes kort over Ørnebjerg. Fredningen er indtegnet med Rødt, og højdekurver er indtegnet.

I fredningen står om arealet, at: "... det ingensinde (må) beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel eller tilførsel af sten eller på nogen anden måde. Græsning forbeholdes. Beplantning må ikke finde sted."

Det er vigtigt, at bakken afgræsses for at undgå, at den gror yderligere til. Ifølge ejerne er det naboen til Ørnebjerg, som lader sine kreaturer afgræsse bakken. De sættes ud ca. 1. juli og tages ind igen til efteråret.

ØRNEBJERGS FLORA

Ørnebjergs vigtigste plantesamfund er overdrevet på toppen af bakken, kærene nord for bakketoppen og stævningsskovene mod nord og vest. Men der er interessante planter på størstedelen af Ørnebjerg.

Overdrevet

Floraen på selve toppen af bakken, på skrænterne mod S og SV samt mod NØ synes helt upåvirket af andet end græsning. Her findes en række arter, som i ”Registreringsskema til naturarealer, overdrev”⁴ er ”en-stjerne-arter”, dvs. at det er arter, som er typiske for overdrev og som tæller i positiv retning for overdrevets kvalitet. På Ørnebjerg drejer det sig om følgende arter:

Alm. Knopurt, Blåhat, Blå-Klokke, Dunet Vejbred, Græsbladet Fladstjerne, Håret Høgeurt, Hulkravet Kodriver, Kamgræs, Knold-Ranunkel, Knold-Rottehale, Kornet Stenbræk, Mark-Frytle, Tjærenellike, Vellugtende Gulaks.

Der findes også enkelte ”to-stjerne-arter,” som indikerer gode overdrev, nemlig Knoldet Mjødurt, Hunde-Viol og Lav Tidsel.

Orkidéen Tyndakset Gøgeurt findes sparsomt på overdrevet. Tyndakset Gøgeurt er ualmindelig, og den vil altid vække opsigt på et overdrev. Den står nordøst for bakketoppen, og vi talte i 2009 ca. 15 blomstrende, hvoraf 3 var hvide (se forsiden og figur 5). I 2024 var der kun 5 og 1 hvid. Tyndakset Gøgeurt er som alle orkideer fredet, men den er ikke sjælden.



Figur 4. Flyfoto fra Kalundborg kommunes hjemmeside. Det hvidt markerede område dækker den bedste del af overdrevet.

⁴ Skema som bruges af kommuner mv. til registrering af naturtyper.

Et overdrev skal bedømmes på andet end en floraliste, nemlig på overdrevets struktur⁵. De naturtypiske strukturer af positiv art for overdrev er: Store fritliggende sten, højryggede agre, en urterig vegetation med mange rosetplanter, stejle uopdyrkede skrænter samt tilstedeværelsen af nedbidte træer og buske med fodpose. Bortset fra fodpose er alle strukturer til stede her på Ørnebjerg, hvilket er særdeles positivt. Desuden er der ikke negative strukturer på det markerede areal.

De skal bemærkes, at tilgroningen af overdrevne er en trussel mod overdrevsfloraen, og at der bør tyndes ud i busk- og træbevoksninger for at tilgodese den øvrige flora.



Figur 5. Tyndakset Gøgeurt på Ørnebjerg, hvoraf den ene er hvid.

Kærene

Nord for toppen af Ørnebjerg på et par nordvendte skrånninger, findes et stort og et lidt mindre rigkær. Også her findes en lang række karakteristiske arter, som viser, at kærene er upåvirkede af gødning, dyrkning mv. Det store antal Maj-Gøgeurter er meget iøjnefaldende, se figur 6 og 14. Som det gælder for Tyndakset Gøgeurt på overdrevet, så er Maj-Gøgeurt i kærene "ikke-truet" men fredet.

⁵ Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejernæs, R. 2009. Naturtilstand på terrestrisk naturarealer – besigtigelse af § 3-arealer. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 736. <http://www.dmu.dk/Pub/FR736.pdf>

I rapporten fra 2009 står, at der er Kødfarvet Gøgeurt i kæret. I 2010 gennemgik vi grundigt kæret for Kødfarvet Gøgeurt og endte med at mene, at de formodede Kødfarvede Gøgeurter alligevel er Maj-Gøgeurt. Maj-Gøgeurt er en ekstrem variabel art, og vi fandt eksemplarer med karakteristiske kendetegn for Kødfarvet Gøgeurt som: pletløse blade, blade bredest forneden, bådformet spids og lyse blomster med små, stærkt tilbagebøjede sideflige. Men konklusionen er alligevel, at der i kæret kun findes Maj-Gøgeurt. Vi optalte ca. 2.000 eksemplarer af Maj-Gøgeurt.



Figur 6. Kæret på Ørnebjerg. I forgrunden Trævlkrone, i baggrunden anes Maj-Gøgeurt.

På feltskemaer over ferske enge (kær) regnes følgende arter som ”en-stjerne-arter”, og det er arter, som findes i kærene på Ørnebjerg:

Alm. Star, Alm. Sumpstrå, Blågrøn Star, Eng-Kabbeleje, Eng-Nellikerod, Glanskapslet Siv, Kamgræs, Kær-Ranunkel, Kær-Padderok, Kær-Snerre, Stinkende Storkenæb, Sump-Forglemmigej, Trævle-krone, Tykbladet Ærenpris, Vellugtende Gulaks.

Djævelsbid er en ”to-stjerne-art”, som vi først har fundet i 2011 i få eksemplarer mellem de to kær på bakkens nordside. Den fulde floraliste ses bagerst i rapporten.

De positive naturtypiske strukturer for fersk eng er⁶: Naturlig fugtig bund, ofte mosrig. Vegetationen domineres af bredbladede urter og halvgræsser, bunden er tuet, ujævn og bunden er trykvandspåvirket, og der er fugtige, artsrige kratpartier. Der foregår ingen afvanding. Det hele gælder for kærene på Ørnebjerg, som således vægtes højest muligt strukturmæssigt.

Skovene

Mod N og V findes fine stævningsskove med bl.a. mange hasselbuske, som er stævnet for ganske mange år siden. Stævning (nedskæring) af træer er en meget gammel driftsform, som blev benyttet lige fra stenalderen og op i det 20. århundrede. Mange træer tåler stævning, hvorefter de skyder op fra roden og danner flerstammede træer. Udbyttet er lige stammer af beskeden tykkelse, som kan bruges til brænde, redskaber, fiskeruser, hegnspæle og hegn. Her i skovene er det Hassel, som er stævnet (figur 7).



Figur 7. Stævnede hasselbuske.

På figur 7 ses skovbunden at være domineret af Vorterod, men der findes også gode, almindelige arter fra skov som Alm. Bingelurt, Hvid- og Gul Anemone, Alm. Guldstjerne, Liden Lærkespore, Hunde-, Krat- og Skov-Viol, Skovsyre og enkelte eksemplarer af Firblad, denne er muligvis

⁶ Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejernæs, R. 2009. Naturtilstand på terrestrisk naturarealer – besigtigelse af § 3-arealer. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 736. <http://www.dmu.dk/Pub/FR736.pdf>

forsvundet? Mere almindelige arter er: Vedbend- og Krat-Ærenpris, Stor Nælde, Mælkebøtte sp., Butbladet Skræppe, Vild Kørvel, Alm. Fuglegræs og Vår-Gæslingeblomst.



Figur 8. Skælrod.

Skælrod er opmærksomhedskrævende, og vi fandt 10 eksemplarer i 2010 og ca. 100 eksemplarer i 2011 i stævningsskoven. Skælrod har slet ikke bladgrønt og ernærer sig ved at snylte, se figur 8. Den snylter især på Hassel og Rød-El.

Træerne i skovene består især af Hassel og Rød-El. Der er også en del Alm. Hyld, Alm. Gedeblad, Alm.- og Engriflet Hvidtjørn, Ask, Benved, Hunderose, Skov-Elm, Skov-Æble (se figur 9), Slåen, og enkelte Vrietorn, Skovene rummer store og gamle træer af bl.a. Stilk-Eg, og enkelte store træruiner øger mangfoldigheden.

Det ville være smukt, om stævningen af Hassel i stævningsskoven kunne genoptages. Gerne efter en plan, som efterligner ældre tiders stævningsdrift. Efterfølgende er dette udført en enkelt gang af kommunen.

Evighedstræ

I skellet ud til marken mod nordøst, står et mægtigt egetræ, en Stilk-Eg. Stammen er ca. 5 m. i omkreds og det er ca. 15 m. højt og kronen måske 20 m. bred. Træet forgrener sig kraftigt 1 m. over jorden, se figur 10. To grene er sammenvoksede, så de danner et hul, hvor man ifølge overtroen kunne føre syge børn eller dårlige lemmer igennem, hvorefter man blev helbredt.

I september 2012 blev træet indviet som "Evighedstræ" nr. 3. Det er Danmarks Naturfredningsforening, som udpeger særligt bemærkelsesværdige træer i Danmark.



Figur 9. Skov-Æble på Ørnebjerg.

Arealerne i øvrigt

Fra indgangen og til overdrevsbakken bliver stejl, ligger et mere fladt og meget eutrofieret overdrev. Det domineres af høje og kraftige græsser og urter, og arealet må være blevet gødet kraftigt i tidens løb, måske fordi køerne holder til nær det lille læskur ved indgangen til det fredede areal. Arealet ses i mellemgrunden på figur 11.

På arealet dominerer Blød Hejre, og der er også Alm. Kvik, Alm. Rapgræs, Burre-Snerre, Gold Hejre, Butbladet Skræppe mv. Der findes også områder med lavere vegetation lidt mod nord med masser af Kamgræs, Fløjlsgræs, Eng-Rapgræs, Lav Ranunkel, Alm. Syre og Alm. Hønsetarm.

Ved "Evighedstræet" findes et kær, eller til tider nærmest en lille sø med arter som Vand-Ærenpris, Tigger-Ranunkel, Fladfrugtet Vandstjerne, Manna-Sødgræs og Tyndskulpet Brøndkarse. I kanten af kæret fandt vi 4 stk. Maj-Gøgeurt i 2011, i 2024 var her over 30. Helt mod nordvest i kanten af skellet ses Håret Viol og Eng-Nellikerod samt en del eksemplarer af den sjældne Ru Bittermælk, som står lige udenfor hegnet.

Vest for leddet på figur 11 findes et fugtigt kær mellem buskene. Kæret skråner mod nordvest og ender i et lille sump-område. I det tidlige forår er skråningen hvid af Vandkarse, se figur 12. Desuden ses Tykbladet Ærenpris og Knæbøjjet Rævehale, i 2023 var her 1 enkelt Maj-Gøgeurt men ingen i 2024.



Figur 10. Egetræet på Ørnebjerg blev udnævnt til Evighedstræ i 2012.



Figur 11. Indgangen til Ørnebjerg med Sødskærm i forgrunden.



Figur 12. Vådområde med blomstrende Vandkarse og Hvidtjørn helt mod vest.

Gamle kulturplanter på Ørnebjerg

I forgrunden på figur 11 ses Sødskærm (Spansk Kørvel) udenfor lågen. Sødskærm er en ældgammel kulturplante, som anses for at være indført til Danmark i den tidlige middelalder⁷. Man ved, at Sødskærm blev dyrket i det schweiziske Benediktinerkloster Sankt Gallen omkring år 820, hvor den blev brugt til både køkkenurt og lægeplante.

På overdrevet nordøst for indgangen til Ørnebjerg, og på de højryggede agre, findes en anden gammel kulturplante, nemlig Kommen. Den omtales i håndskrifter fra omkring år 1300 (Harpestreng), og den er også fundet i arkæologiske udgravninger fra den tidlige middelalder. Kommen anvendtes som lægeplante og til madlavning, og den bruges stadigvæk som smags giver i ost og brød, også som krydding af snaps.

Tidligere floralister

Medarbejdere fra det tidligere Vestsjællands Amt har besøgt Ørnebjerg adskillige gange. Deres floralister kan ses på Naturdata-portalen (Danmarks Miljøportal)⁸. Herunder står de interessante arter, som Amtet har fundet, og som vi **ikke** har fundet endnu:

10-5-94 og 9-7-95: Engblomme.

9-7-95: Bakke-Soløje, Butblomstret Sødgræs, Engblomme, Fåre-Svingel, Håret- og Glat Løvefod.

3-8-06: Vild Hør.

8-8-06: Gærde-Vikke.

Fund af Engblomme er væsentligt, da Engblomme er en temmelig sjælden og meget smuk plante, som er aftagende i Danmark.

Rødlistede⁹ og positiv-arter¹⁰

Nationalt Rødlistet

Trådstænglet Løvefod er Næsten Truet (NT)

Regionalt rødlistede

Butfinnet Mangeløv er Næsten Truet (NT)

Gulgrøn Løvefod er forsvundet (RE).

Trådstænglet Løvefod (NT) er ret sjælden i NØ-Sjælland og Himmerland og i øvrigt sjælden til meget sjælden i Danmark. I Vestsjælland er den set tre steder indenfor de sidste 10 år (Leth 2006), på Tuse Næs, syd for Tåge Huse og på Ørnebjerg.

Butfinnet Mangeløv (regionalt NT) er ret sjælden i Danmark men er dog fundet spredt over det meste af landet.

Gulgrøn Løvefod (regionalt RE) er forsvundet ifølge Leth (2019). Den er tidligere fundet to steder i Vestsjælland (Leth, 2006). Vi mener dog, at den findes på Ørnebjerg, og vi vil lede efter den igen.

⁷ Lange, Johan 1999: Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark. – DSR Forlag.

⁸ www.naturdata.dk

⁹ Rødliste 2019: Den danske Rødliste – AU Ecoscience

¹⁰ Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands flora 2006.- På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside

Ørnebjergs positiv-arter

Positiv-art	Kategori
Alm. Hvene	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Star	AP
Blågrøn Star	AP
Desmerurt	HP
Djævelsbid	HP
Dunet Dueurt	AP
Dunet Vejbred	AP
Engkarse	HP
Eng-Nellikerod	AP
Firblad	UP
Gul Anemone	HP
Hare-Kløver	HP
Hirse-Star	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hunde-Viol	HP
Håret Høgeurt	AP
Håret Star	AP
Håret Viol	HP
Kamgræs	AP
Kantet Perikon	AP
Knoldet Mjødurt	AP
Kornet Stenbræk	AP
Kær-Høgeskæg	AP
Kær-Snerre	AP
Kær-Trehage	AP
Langbladet Ranunkel	HP

Lav Tidsel	HP
Liden Lærkespore	HP
Lund-Padderok	UP
Læge-Ærenpris	HP
Maj-Gøgeurt	HP
Mark-Frytle	AP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Rank Vinterkarse	UP
Ru Bittermælk	SP
Skælrod	SP
Stor Knopurt	AP
Stribet Kløver	HP
Sump-Forglemmigej	AP
Tjærenellike	HP
Toradet Star	AP
Trævekrone	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Tyndakset Gøgeurt	UP
Vandkarse	UP
Vand-Ærenpris	AP
Vellugtende Gulaks	AP
Vår-Vikke	HP

Tabel 1. Positiv-arter fra Ørnebjerg

AP: Alm. positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Nok rummer Ørnebjerg kun få rødlistede arter, men til gengæld er floraen rig på arter, som er ualmindelige og såre karakteristiske for upåvirkede kær og overdrev – efterhånden ret sjældne naturtyper. Desuden er de naturtypiske strukturer for både kær og overdrev helt i top. Samlet set må både kær og overdrev karakteriseres som meget fine, men ikke enestående.

Svampe

Vi har registreret følgende svampe i 2010: Citrongul Vokshat, Eng-Vokshat, Honningsvamp, Judasøre, Krumskællet Skælhat, Skarlagen Vokshat, Snehvid Vokshat, Tøndersvamp. Det skal bemærkes, at tilstedeværelsen af vokshatte indikerer, at overdrevet er gammelt.

Dyr

Når floraen er god, findes der muligheder for at også insektfaunaen er interessant. Mens vi botaniserede, så vi følgende sommerfugle: Admiral, aurora, blåfugl sp., græsrandøje, grønåret-, stor- og lille kålsommerfugl, lille ildfugl, nældens takvinge og okkergul randøje. Ingen af disse arter er sjældne, men de kunne måske antyde, at også mere interessante arter findes på bakken. Vestsjællands Amt har i 1-6-97 noteret storplettet perlemorsommerfugl på Ørnebjerg.

Vi har også noteret de fugle, som sås eller hørtes ved besøgene, uden at det på nogen måde skal opfattes som en fuldstændig liste: blå kærhøg, bogfinke, digesvale, dompap, fasan, gråand, gråkrage, gulspurv, gøg, gransanger, grønirisk, gulbug, gulspurv, husskade, landsvale, løvsanger, mursejler, musvit, musvåge, nattergal, ravn, rørhøg, rød glente, sanglærke, skovdue, skovskade, spætmejse, solsort, stillits, stor flagspætte, strandskade, vibe.

Rådyr, hare og egern holder også til på bakken. I vådområderne så vi spidssnudet frø. Den er absolut ikke sjælden i Danmark, men den er interessant, idet den står på EF-habitatdirektivets Bilag nr. IV, hvilket omfatter dyrearter, som er strengt beskyttet af fællesskabet. Vi har altså i Danmark pligt til at værne om arten.



Figur 14. Maj-Gøgeurt

Flora-liste	Alm. Mangeløv	Draphavre	Firblad
Ager-Padderok	Alm. Rajgræs	Dunet Dueurt	Fløjlsgæs
Ager-Snerle	Alm. Rapgræs	Dunet Steffensurt	Glanskapslet Siv
Ager-Svinemælk	Alm. Rødknæ	Dunet Vejbred	Glat Burre
Ager-Tidsel	Alm. Røllike	Dusk-Syre	Glat Sumpstrå
Ager-Vejbred	Alm. Star	Døvnælde	Glat Vejbred
Alm. Agermåne	Alm. Svinemælk	Eng-Brandbæger	Glat Ærenpris
Alm. Bingelurt	Alm. Syre	Eng-Forglemmigej	Gold Hejre
Alm. Bjørneklo	Alm. Vej-Pileurt	Eng-Kabbeleje	Græsbladet
Alm. Fuglegræs	Bidende Ranunkel	Engkarse	Fladstjerne
Alm. Guldstjerne	Blød Hejre	Eng-Nellikerod	Gul Anemone
Alm. Hanekro	Blød Storkenæb	Eng-Rapgræs	Gul Fladbælg
Alm. Hanespore	Blågrøn Star	Eng-Rottehale	Gul Kløver
Alm. Hulsvøb	Blåhat	Eng-Rævehale	Gulgrøn Løvefod
Alm. Hundegræs	Blåstjerne	Enskættet	Gul Snerre
Alm. Hvene	Bugtet Kløver	Sumpstrå	Hanekro sp.
Alm. Hønsetarm	Burre-Snerre	Enårig Rapgræs	Harekløver
Alm. Knopurt	Butbladet Skræppe	Erantis	Hirse-Star
Alm. Kongepen	Butfinnet	Feber-Nellikerod	Horse-Tidsel
Alm. Kvik	Mangeløv	Fladfrugt	Hulkravet
Alm. Kællingetand	Cikorie	Vandstjerne	Kodriver
Alm. Mjødurt	Desmerurt	Finbladet Rødknæ	Hunde-Viol
	Djævelsbid	Fin Kløver	Hvid Anemone

Hvid-Kløver	Liden Andemad	Smalbladet	Vand-Ærenpris
Hvidmelet Gåsefod	Liden Burre	Mangeløv	Vedbend-Ærenpris
Hyrdetaske	Liden Klokke	Småblomstret	Vellugtende
Høst-Borst	Liden Lærkespore	Balsamin	Gulaks
Håret Høgeurt	Lugtløs Kamille	Småkronet	Vild Kørvel
Håret Star	Lund-Padderok	Gedeskæg	Vild Løg
Håret Viol	Lyse-Siv	Spidsbladet Vej-	Vintergæk
Judaspenge	Læge-Oksetunge	Pileurt	Vorterod
Kamgræs	Læge-Ærenpris	Stinkende	Vår-Brandbæger
Kantet Perikon	Lådden Dueurt	Storkenæb	Vår-
Kløftet Storkenæb	Maj-Gøgeurt	Stor Fladstjerne	Gæslingeblomst
Knoldet Brunrod	Manna-Sødgræs	Stor Knopurt	Vår-Vikke
Knoldet Mjødurt	Mark-Frytle	Storkronet	
Knold-Ranunkel	Mark-Krageklo	Ærenpris	Træer/buske
Knold-Rottehale	Mark-Ærenpris	Stor Nælde	Alm. Gedeblad.
Knop-Siv	Marts-Viol, også	Stribet Kløver	Alm. Hvidtjørn
Knæbøjet	hvide	Sump-	Alm. Hyld
Rævehale	Mose-Bunke	Evighedsblomst	Alm. Røn
Kommen	Muse-Vikke	Sump-Fladstjerne	Ahorn
Kors-Andemad	Mælkebøtte sp.	Sump-	Ask
Korsknap	Nyrebladet	Forglemmigej	Benved
Kornet Stenbræk	Ranunkel	Sumpkarse	Brombær sp.
Kost-Fuglemælk	Opret Hønsetarm	Svine-Mælde	Engriflet Hvidtjørn
Krat-Viol	Pindsvine-	Sødskærm	Fuglekirsebær
Krat-Ærenpris	Kartebolle	Tigger-Ranunkel	Glat Hunderose
Kruset Skræppe	Prikbladet Perikon	Tjærenellike	Lav Kornel
Krybende Potentil	Pyrenæisk	Toradet Star	Rubladet Rose
Kryb-Hvene	Storkenæb	Trævlekrone	Rød-El
Kæmpe-Bjørneklo	Rank Vejsennep	Trådstænglet	Skov-Elm
Kær-Høgeskæg	Rank Vinterkarse	Løvefod	Skov-Æble
Kær-Padderok	Ru Bittermælk	Tudse-Siv	Slåen
Kær-Ranunkel	Rød-Kløver	Tusindfryd	Stilk-Eg
Kær-Snerre	Rød Svingel	Tveskægget	Vedbend
Kær-Trehage	Rød Tvetand	Ærenpris	Vinter-Eg
Kål-Tidsel	Skive-Kamille	Tykbladet	Vrietorn
Lancet-Vejbred	Skovarve	Ærenpris	
Langbladet	Skov-Fuglegræs	Tyndakset Gøgeurt	
Ranunkel	Skovsyre	Tyndskulpet	
Lav Ranunkel	Skov-Viol	Brøndkarse	
Lav Tidsel	Skælrod	Vandkarse	

Afslutning

Fotos HGC, dog figur 10 CC.

Tak til Anne Bronée for teknisk support.

Eventuel henvendelse til carstenbclausen@hotmail.dk

Et besøg på Ørnebjerg er altid en oplevelse. Tag gerne madkurven med og nyd den storslåede udsigt over Tissø og Lille Åmose. Men husk du er gæst på et privat område, så ryd op efter dig.