

Nekselø

- set fra en anden vinkel



Nekseløs sydlige del med den lille sø, hvor man før kunne finde og høre klokkefrø, men som nu anses for uddød? På skråningens nordøstlige del (tv. udenfor foto) vokser den meget sjældne Kvast-Høgeurt (se fotos side 9).

Carsten Clausen
Ny udgave 2026

Nekselø, - generelt set.

Kalundborg kommune er beriget med 3 øer, Sejerø med ca. 340 indbyggere, den lille ubeboede Musholm samt Nekselø med pt.18 indbyggere. På Nekselø har der været menneskelig aktivitet siden ældre stenalder. Øen har i perioder været delt mellem Århus - og Roskilde bispesæde, og efter Reformationen i 1536 overgik øen til Kronen. Siden har Nekselø været på skiftende hænder, inden den i 1805 ved salg til øboerne overgik til selveje. Nekselø er på ca. 220 ha og blev i 1951 totalfredet. Fredningen blev i 1985 strammet op for at sikre ”øens landskabelige skønhed og sjældne plante- og dyreliv”, (Overfredningsnævnets afgørelse). Nekselø har tidligere været opdyrket, hvor det har været muligt, men i dag er landbrug næppe rentabelt. Størstedelen af øen udgøres af op til 41 meter høje, bakkede overdrev, der for størstedelen afgræsses eller slås. Arealerne er for det meste sandede, men de stejle vestvendte skrånninger indeholder en del ler, der til tider skrider ned, hvorved de karakteristiske ”fårestier” opstår. Den nordlige og sydlige del af øen er mere flad, og flere steder er der mindre søer, lidt mose samt strandenge. Syd for havnen på østsiden er der noget af den oprindelige vilde skov, som fremover, ifølge fredningsbestemmelsen, skal bevares som urørt skov. Overalt ses en mængde stengærder, som naturligvis indgår i fredningen. Nekselø har mindre nedbør, højere temperatur og flere solskinstimer end landsgennemsnittet. Øen har det man kalder Storebæltsklima, hvilket bevirker, at bl.a. varmekrævende plante- og dyreliv har gode livsbetingelser. Øens over 600 planter omfatter flere sjældne arter, her i blandt Ager-Kohvede og Kantet Kohvede, begge er halvsnylteplanter (foto 8 og 9), Hjorterod (foto herunder og side 8), Korn-Ridderspore (foto side 3), Kyst-Markarve, Bakke-Soløje, Svalerod og den meget giftige Bulmeurt.



Foto 1. Hjorterod med Gul Snerre i bunden.

Nekselø er desuden kendt for sin meget fine bestand af klokkefrø, som måske i skrivende stund desværre er uddød? Yngel af klokkefrø fra øen er tidligere udsat på bl.a. Røsnæs, for at ophjælpe bestanden der, måske skal nogle af dem nu tilbage til Nekselø? Løgfrø og Grønbroget tudse skulle også yngle i øens vandhuller.

Det meget rige insektliv omfatte også sjældne sommerfugle, her iblandt den dagflyvende tigersnerleugle, som her har sit eneste bofaste levested i Danmark.

Af pattedyr er der en god bestand af rådyr, og fuglelivet er begunstiget af en større hættemågekoloni ved Sømse på nordøen (foto side 11).

Der ligger 6-7 gårde, 4-5 beboelseshuse samt en håndfuld sommerhuse på Nekselø, og for at komme til øen må man tage færgen fra Havnsø. Overfarten tager ca. 20 minutter, og velankommen til øen træder man ind i en helt anden verden. Her er der absolut intet, der minder om der, hvor man kom fra, ingen forretninger, ikke megen trafik, ingen asfalt, og kun i sommerweekenderne er der en del besøgende. Ellers har man stort set øen for sig selv.

Nekselø, - set fra en anden vinkel

En lidt anderledes vinkel at beskrive øen på kunne være at fordybe sig i et emne som for eksempel geologien, fugle- eller det øvrige dyreliv.

Jeg har valgt at kigge nærmere på floraen, og har besøgt Nekselø over 30 gange de seneste 7-8 år. De mange besøg har resulteret i fund af over 600 forskellige planter. At studere og beskrive floraen er der mange andre, der har gjort igennem tiderne, men derfor kan dette lille skrift måske alligevel kaste nyt lys over øens spændende og mangfoldige planteliv.

En udførlig flora-liste ses bagest i skriftet, og navngivningen af planterne angives som i ”Nordens Flora” (Mossberg og Stenberg, 2020). Et sp. efter arten betyder, at denne ikke er nærmere bestemt, eks. Mælkebøtte, sp..



Kom-Ridderspore



Tornet Tidsel fra sydspidsen af øen, øverst th. ses Korsknep.

Adgang til øens planteliv

Skal man fordybe sig i øens planteliv, må man ofte besøge området flere gange i sæsonen, og hvis man ønsker en fyldig undersøgelse, kan besøgene endda strække sig over en årrække. På Nekselø skal man også tage hensyn til, at i fuglenes yngletid, fra 1. april til 15. juli, er det kun tilladt at færdes ad de anlagte veje og stier (se kort bagest). Dette er for en botaniker ret uheldigt, da det netop er i denne periode, at de fleste planter er i fuldeste flor. På trods af dette kan man alligevel finde adskillige arter blot ved at følge de anlagte stier, som fører på en ca. 5 km. rundtur.

På en sådan tur kan man komme tæt på gode plantelokaliteter f.eks. de stejle vestvendte skrænter og den skovklædte østside, forbi den sydlige sø og det nordlige græsklædte bakkelandskab. Med en god kikkert kan man også indfange forskellige planter, som man ellers ikke lige har på tæt hold. Udenfor fuglenes yngletid kan man færdes langs kysten hele øen rundt, og man kan evt. lave aftale med grundejerne om færdsel på deres ejendom.

I sommerperioden kan man tage den tidligste færge over og sidste færge retur, så har man ca. 8½ time til opholdet på Nekselø. Husk at tjekke færgetiderne, for er man først fordybet i arbejdet, flyver tiden let, og man skulle jo nødig blive agterudsejlet.



Frugter på Vrietorn, et ikke helt almindeligt mindre træ eller busk.

Kort omtale af enkelte, mere sjældne planter

Vrietorn (foto herover) vokser i få eksemplarer langs stien på vestsiden af øen og i krattet syd for Ørnekul samt i skoven ved Trolddalen. **Kvast-Høgeurt** (fotos side 9) er uhyre sjælden i Danmark, og på den nye "National Rødliste 2019" vurderes den til at være Moderat Truet (EN). Atlas Flora Danica (2015) har den kun i 4 ruder, i dette værk er Danmark opdelt i ruder på 5 x 5 km.. Seneste fund på Nekselø daterer sig tilbage i 1930'erne. Men jeg fandt Kvast-Høgeurt i juli 2021 og 2025 på skråningen nordøst for Øgård (forsiden), her voksede den i et antal af 25-30 stk. blandt **Håret Høgeurt**. Langs "hovedvejen" kan man finde **Vinge-Pileurt** (foto side 9) i kratbeplantningerne. **Tornet Tidsel** (foto side 4) findes i enorme mængder på øens sydspids, hvor der også ses enkelte eksemplarer af den meget giftige **Bulmeurt**. **Korn-Ridderspore** (foto side 3) kan findes øverst på den vestvendte kystskråning ovenfor Ørnekul og længere nordpå forbi Marianelund, og iflg. Atlas Flora Danica angives Nekselø, som dens eneste bofaste voksested i Danmark. På denne strækning ses også flere steder **Ager-** og **Kantet Kohvede** også **gule**, samt **Grådodder** (se foto side 10), **Ager-Stenfrø**, **Bakke-Soløje** og **Hjortetrod** (foto side 1 og 7). På skråningerne vokser ligeledes **Bakke-Jordbær**, **Grå Vår-Potentil**, **Vår-Potentil** (se foto side 8), **Knopnellike**, **Liden Sneglebælg**, **Sand-Rottehale** samt **Småskulpet Dodder**. Nedenfor Ørnekul er der et rigkær, som er meget tilgroet af forskellige starrer, her findes bl.a. **Kødfarvet Gøgeurt** (ca.250 stk. se foto side 11).

Leverurt angives også at skulle vokse her, men er ikke fundet endnu. Langs bredden af Sømose på øens nordlige del vokser bl.a. **Sump-Nælde** i større mængde og helt mod nord, kan man finde **Kyst-Markarve**. **Kassubisk Vikke** blev fundet i vejkanthen nord for kirken, og **Tykbladet Fladstjerne** langs vestkystens nordlige del. **Liggende Potentil** fra sydspidsens vestside er usikker, da den formodes at være forsvundet fra Vestsjælland (Status for Vestsjællands Flora 2006, Peter Leth). Der kan evt. være tale om en krydsning? Bestemmelse af de små potentiller er ofte meget vanskelig..

Efter et tip fandt jeg i okt. 2023 et meget stort eksemplar af **Strand-Hornskulpe** på stranden øst for Sømose, den er ellers mest kendt fra den vestlige del af Limfjorden og vestkysten af Jylland, på Sjælland kendes den kun fra Odden havn og Veddinge strand (se foto herunder). I 2024 var der 2 blomstrende eksemplarer og mange mindre uden blomst, her i 2025 var der mange flere, og en hel del havde skulper, det tyder på, at den er under kraftig fremgang.

Endnu et tip i 2025 resulterede i fund af en lille håndfuld Skov-Hullæbe i en remise vest for Ulddal bakke, Skov-Hullæbe er vor mest almindelige orkidè, og er som alle andre orkidèer fredet.



Strand-Hornskulpe



Hjørtetrod, bemærk svirrefluerne th. omkring blomsterhovedet.

National- og Regional Røddlistede arter samt Positiv-arter.

Flere af de nævnte planter er **National**- eller **Regional** Røddlistede arter, dvs. planter som er meget sjældne eller truet på den ene eller anden måde. (Regional svarer til det tidligere Vestsjællands amt). I alt er der 17 fund af **National** Røddlistede - og 10 **Regional** Røddlistede arter. I floralisten bagest i denne rapport er de markeret med henholdsvis **rødt** eller **blåt** med kategorierne i parentes. Kategorierne er:

- (NT) = Næsten Truet
- (VU) = Sårbar
- (EN) = Moderat Truet
- (CR) = Kritisk Truet.

Positiv-arter er planter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper, og de indikerer god naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang i Vestsjælland og nu kun findes i få områder. Der er fundet 166 af disse planter, hvilket er mange, og de er markeret med **grønt** i floralisten efterfulgt af en angivelse af deres hyppighed i parentes:

(AP) = Almindelig positiv-art

(HP) = Hist og her positiv-art

(UP) = Ualmindelig positiv-art


(SP) = Sjælden positiv-art

Trods de mange besøg og fund af over 600 planter, kan flere arter være overset. Der vil også gennem årene ske en ændring i sammensætningen af både plante- og dyrelivet. Naturen veksler hele tiden, noget forsvinder, og nyt kommer til (eksempelvis Strand-Hornskulpe).

Palle Gravesen (1979) har samlet kildemateriale fra år 1900-1979 og skriver, at der på øen er mindst 530 arter. Han omtaler følgende arter, som jeg ikke har fundet endnu, men som måske stadig findes på Nekselø: Asparges, Baltisk Svingel, Hedelyng, Kattefod, Klinte, Klit-Siv, Lancetbladet Høgeurt, Leverurt, Loppe-Star, Mat Potentil, Salep-Gøgeurt, Skede-Star, Skrænt-Star, Smalbladet-Hareøre, Smalbladet-Klokke, Smalbladet Rapgræs, Stilket Kilebæger, Sump-Hullæbe, Tormentil, og Vibefedt. Samtidig nævner han, at der er mindst 25 Star-arter på øen, jeg har fundet 18, så der er stadig en del at lede efter.



Vår-Potentil




Kvast-Høgeurt



Vinge-Pileurt findes hist og her i krat langs veje og stier. De rødlige stilke er karakteristisk for denne art.



Det bakkede landskab med de stejle, vestvendte skrænter. Øverst th. kirken.



Ager-Kohvede, øverst th. anes en gruppe (5-6 stk.) af Grådobder. Foto: Anne Bronée.



Kantet Kohvede, her i gul.



Den smukke Kødfarvet Gøgeurt.
Foto: Anna Slots.



Udsigt til Sømse på den nordlige del af øen. I baggrunden Bjergene med Vejrhøj (121 m.) i Odsherred.

Tak

En meget stor tak til Anna og Peter for deres venlige gæstfrihed, som har indbefattede et par overnatninger samt tilladelse til at færdes på Øgårdens arealer, der omfatter det meste af den sydligste del af øen.

Også en tak til Mathias og Anne Bronée for teknisk bistand.

Endelig kan jeg ikke takke Hans Guldager Christiansen nok for hans store indsats igennem de sidste 15-16 år, hvor vi sammen har lavet omkring 60 flora-rapporter fra især Kalundborg kommune. De fleste kan findes på www.dn.dk/kalundborg. Hans har deltaget i et besøg på Nekselø i sommeren 2022, og han har især bestemt de vanskelige græsser og starer samt indplaceret positiv-arterne og de rødlistede arter på floralisten bagest i dette skrift.

Såfremt besøgende skulle finde planter, som ikke er med på flora-listen, vil en henvendelse til carstenbclausen@hotmail.dk være yderst velkommen.

Alle fotos: CC, hvor intet andet er nævnt.

Nekselø er absolut et besøg værd men husk: **Naturen må gerne betrædes, men træd varsomt!**

Litteratur

Gravesen, Palle 1976: Oversigt over botaniske lokaliteter. 1. Sjælland. - Fredningsstyrelsen.

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. - Gyldendal.

Jørgensen, Henrik og Flemming Rune 2019: Træer og buske i Danmark, - Gyldendal.

Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006, - Vestsjællands amt.

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens Flora. - Gyldendal. Oversat og bearbejdet til dansk af Jon Feilberg.

Floraliste, 2018-2025

Aften-Pragtstjerne
Ager-Kohvede (NT)

Ager-Kål
Ager-Mynte
Ager-Padderok
Ager-Sennep
Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Stenfrø
Ager-Svinemælk
Ager-Tidse
Ager-Vejbred
Akselblomstret Star (AP)

Alm. Agermåne
Alm. Bingelurt
Alm. Brandbæger

Alm. Brunelle
Alm. Dværgløvefod
Alm. Engelsød
Alm. Firling
Alm. Fredløs (AP)
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldstjerne
Alm. Gyldenris (AP)
Alm. Gåsemad
Alm. Hanekro
Alm. Havre
Alm. Hirse
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvede
Alm. Hvene (AP)
Alm. Hønsetarm
Alm. Katost

Alm. Knopurt, også hvid (AP)
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Mangeløv
Alm. Markarve
Alm. Mjødurt
Alm. Mælkeurt (UP)
Alm. Pengeurt
Alm. Pimpinelle (AP)
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Rundbælg (AP)
Alm. Rødknæ
Alm. Røllike
Alm. Sankthansurt
Alm. Skjolddrager
Alm. Spergel

Alm. Star (AP)
 Alm. Stedmoderblomst (HP)
 Alm. Svinemælk
 Alm. Syre
 Alm. Sølv-Potentil (AP)
 Alm. Torskemund
 Alm. Vej-Pileurt
 Alsike-Kløver
 Bakke-Forglemmigej
 Bakke-Jordbær (NT)
 Bakke-Nellike (HP)
 Bakke-Soløje (NT)
 Bakke-Svingel
 Bakketidsel (NT)
 Baltisk Strandsennep
 Bidende Ranunkel
 Bidende Stenurt (HP)
 Billebo-Klaseskærm (AP)
 Bitter Bakkestjerne
 Bittersød Natskygge
 Bjerg-Rørhvene
 Blank Ærenpris
 Bleggul Snerre
 Bleg Pileurt
 Blodrød Storkenæb (HP)
 Blæresmælde
 Blære-Star
 Blød Hejre
 Blød Storkenæb
 Blå Anemone (HP)
 Blågrøn Gåsefod (AP)
 Blågrøn Kogleaks
 Blågrøn Løvefod
 Blågrøn Star (AP)
 Blåhat
 Blåmunke (AP)
 Blåstjerne
 Blåtop (AP)
 Bredbladet Dunhammer
 Bredbladet Mangeløv
 Bredbladet Mærke
 Bredbladet Timian (HP)
 Brudelys (HP)
 Bugtet Kløver
 Bulmeurt
 Burre-Snerre
 Butbladet Skræppe
 Butbladet Vandaks (VU)
 Bølget Bunke (AP)
 Canadisk Bakkestjerne
 Cikorie
 Dag-X Aften-Pragtstjerne
 Dansk Arum (SP)
 Dansk Astragel (UP)
 Dansk Kokleare (HP)
 Djævelsbid (HP)
 Draphavre
 Drue-Gåsefod (SP)
 Dunet Dueurt (AP)
 Dunet Havre (HP)
 Dunet Vejbred (AP)
 Dusk-Syre
 Dynd-Padderok (AP)
 Døvnælde
 Eng-Brandbæger
 Eng-Forglemmigej
 Eng-Havre (HP)
 Eng-Kabbeleje
 Engkarse (HP)

Eng-Rapgræs
 Eng-Rottehale
 Eng-Rævehale
 Enkelt Pindsvineknop (HP)
 Ensidig Klokke
 Enårig Rapgræs
 Erantis
 Farve-Reseda
 Feber-Nellikerod
 Femhannet Hønsetarm
 Fersken-Pileurt
 Filtbladet Kongelys
 Filtet Hønsetarm
 Filtet Burre
 Finbladet Rødknæ
 Finbladet Vejsennep
 Finger-Lærkespore (NT)
 Fin Kløver
 Fingerbøl
 Firkløft
 Fjernakset Star (HP)
 Fladstrået Rapgræs (AP)
 Fladtrykt Kogleaks (UP)
 Fladtrykt Siv
 Fliget Brøndsel
 Fliget Tvetand
 Fliget Vejbred (UP)
 Flipkrave (HP)
 Fløjlsgræs
 Foder-Kulsukker
 Foder-Lucerne
 Foder-Spergel
 Foder-Vikke, også hvidgule
 Forskelligfarvet Forglemmigej (HP)
 Følfod
 Fåre-Svingel (AP)
 Gaffel-Vortemælk
 Gederams
 Gift-Salat
 Glanskapslet Siv
 Glat Burre
 Glat Dueurt
 Glat Rottehale (UP)
 Glat Sumpstrå
 Glat Sølv-Potentil (AP)
 Glat Vejbred
 Glat Ærenpris
 Gold Hejre
 Grenet Pindsvineknop
 Græsbladet Fladstjerne
 Grøn Høgeskæg
 Gråbynke
 Gråodder (SP)
 Grå Star (SP)
 Grå Vår-Potentil (EN)
 Gul Anemone (HP)
 Gul Evighedsblomst (NT)
 Gul Fladbælg
 Gul Iris
 Gul Kløver
 Gul Lærkespore
 Gul Sennep
 Gul Snerre
 Gærde-Kartebolle
 Gærde-Kørvel
 Gærde-Snerle
 Gærde-Valmue
 Gærde-Vikke
 Gåsepotentil

Hare-Kløver (HP)
 Haremad
 Hare-Star (HP)
 Harril (AP)
 Have-Nøkkerose
 Have-Påskelilje
 Hejrenæb
 Hjertegræs (AP)
 Hjertespad
 Hjorterod (HP)
 Hjortetrøst
 Honningurt
 Horse-Tidsel
 Hulkravet Kodriver (AP)
 Hulrodet Lærkespore (AP)
 Humle-Sneglebælg
 Hundekvik (UP)
 Hundesalat (SP)
 Hunde-Viol (HP)
 Hvas Randfrø
 Hvid Anemone
 Hvid-Kløver
 Hvid Nøkkerose
 Hvidmelet Gåsefod
 Hvid Okseøje
 Hvid Snerre
 Hvid Stenkløver
 Hylster-Guldstjerne (UP)
 Hyrdetaske
 Høst-Borst
 Høst-Rødtop
 Håret Frytle
 Håret Hjertespad
 Håret Høgeurt (AP)
 Håret Kortstråle
 Håret Star (AP)
 Håret Sølv-Potentil (AP)
 Håret Viol (HP)
 Hårfliget Vandraunkel (NT)
 Italiensk Rajgræs
 Jordbær-Kløver (AP)
 Kamgræs (AP)
 Kantet Dueurt
 Kantet Kohvede, også gule (EN)
 Kantet Perikon (AP)
 Kassubisk Vikke (NT)
 Kattehale
 Kiddike
 Kirtel-Dueurt
 Kirtel-Kortstråle
 Klit-Stedmoderblomst (UP)
 Klæbrig Brandbæger
 Klæbrig Hønsetarm (UP)
 Klæg-Siv (AP)
 Kløftet Storkenæb
 Knoldet Brunrod
 Knoldet Mjødurt (AP)
 Knold-Ranunkel (AP)
 Knold-Rottehale
 Knopnellige (NT)
 Knop-Siv (AP)
 Knudet Pileurt
 Knæbøjet Rævehale
 Kornblomst
 Kornet Stenbræk (AP)
 Korn-Ridderspore
 Korn-Valmue
 Kors-Andemad
 Korsknep

Kost-Fuglemælk
 Kransbørste (AP)
 Krans-Mynte
 Krat-Viol
 Krokus
 Krumhals
 Kruket Skræppe
 Kruket Tidsel
 Krybende Potentil
 Kryb-Hvene
 Kugle-Museurt
 Kvast-Høgeurt (EN)
 Kyst-Markarve (NT)
 Kæmpe-Svingel
 Kær-Dueurt (AP)
 Kær-Galtetand
 Kær-Guldarse
 Kær-Padderok (AP)
 Kær-Ranunkel
 Kær-Snerre (AP)
 Kær-Star (AP)
 Kær-Svinemælk
 Kær-Svovlrød (AP)
 Kær-Tidsel (AP)
 Kær-Trehage (AP)
 Kødet Hindeknæ (AP)
 Kødfarvet Gøgeurt (AP)
 Kølle-Valmue
 Lancet-Vejbred
 Langastakket Væselhale (VU)
 Lav Ranunkel
 Lav Tidsel (HP)
 Liden Andemad
 Liden Burre
 Liden Hundepersille
 Liden Klokke, også hvid
 Liden Lærkespore (HP)
 Liden Nælde
 Liden Skjaller (SP)
 Liden Sneglebælg (EN)
 Liden Storkenæb
 Liden Tusindgylden (HP)
 Liden Tvetand
 Liggende Potentil (RE)
 Liggende Vej-Pileurt
 Lugtløs Kamille
 Lundgylden
 Lund-Rapgræs
 Lyse-Siv
 Læge-Hundetunge
 Læge-Jordrøg
 Læge-Oksetunge, også hvid
 Læge-Ærenpris (HP)
 Løgarse
 Lådden Dueurt
 Lådden Perikon (SP)
 Mangebladet Lupin
 Mangeblomstret Frytle (AP)
 Manna-Sødgræs
 Marehalm (AP)
 Marietidsel
 Mark-Bynke (AP)
 Mark-Firling
 Mark-Frytle (AP)
 Mark-Krageklo (AP)
 Mark-Stenkløver
 Mark-Tusindgylden (UP)
 Mark-Ærenpris
 Marts-Viol, også røde

Merian (HP)
 Moskus-Katost
 Musehale
 Muse-Vikke
 Mælkebøtte sp.
 Nat-Limurt
 Nikkende Brøndsel
 Nikkende Limurt (HP)
 Nikkende Star (AP)
 Nælde-Klokke
 Olie-Ræddike
 Opret Hønsetarm
 Pastinak
 Peberrod
 Pigget Star (HP)
 Prikbladet Perikon
 Pyrenæisk Storkenæb
 Påskelilje, også fyldte
 Rank Sølv-Potentil (AP)
 Rank Vejsennep
 Rank Vinterkarse (UP)
 Regnbue-Lupin
 Rejnfan
 Ris-Dueurt (HP)
 River (HP)
 Rosen Katost (HP)
 Roset-Springklap
 Rundbladet Katost
 Ru Svinemælk
 Rød Arve
 Rødbrun Kogleaks (NT)
 Rød Gåsefod
 Rød-Kløver
 Rød Svingel
 Rød Tandbæger
 Rød Tvetand
 Rørgræs
 Salturt (Kveller) (AP)
 Samel (SP)
 Sandkryb
 Sand-Lucerne
 Sand-Løg (AP)
 Sand-Rottehale (NT)
 Sand-Star (AP)
 Sand-Vikke
 Segl-Sneglebælg (HP)
 Seline (HP)
 Sideskærm (AP)
 Skarntyde
 Skive-Kamille
 Skovarve
 Skov-Burre
 Skov-Galtetand
 Skov-Hanekro
 Skov-Hullæbe (HP)
 Skov-Hundegræs (HP)
 Skov-Løg
 Skov-Salat
 Skov-Stilkaks
 Skvalderkål
 Skærm-Vortemælk
 Skønbægret Mælde (VU)
 Slangehoved
 Smalbladet Dunhammer
 Smalbladet Høgeurt (AP)
 Smalbladet Kællingetand (AP)
 Smalbladet Vej-Pileurt
 Smalbladet Vikke
 Smalbladet Ærenpris

Småfrugtet Pindsvineknop
 Småkronet Gedeskæg
 Småskulpet Dodder
 Snerle-Pileurt
 Sodaurt
 Solsikke
 Sort Natskygge
 Spidsbladet Vej-Pileurt
 Spidskapslet Star
 Spyd-Mælde
 Stilk-Mælde (UP)
 Stinkende Storkenæb
 Stivhåret Borst (HP)
 Stivhåret Kalkkarse (HP)
 Stiv Star (AP)
 Storblomstret Hønsetarm
 Storblomstret Vandrånunkel (AP)
 Storbægret Storkenæb
 Stor Fladstjerne
 Stor Knopurt (AP)
 Storkronet Ærenpris
 Stor Nælde
 Stor Singrøn
 Stor Skjaller (HP)
 Stortoppet Hvene
 Strand-Annelgræs (AP)
 Strandasters (AP)
 Strand-Bede
 Strand-Engelskgræs (AP)
 Strand-Firling (HP)
 Strand-Gulerod
 Strandgåsefod (AP)
 Strand-Hornskulpe (EN)
 Strand-Kamille (HP)
 Strand-Karse (NT)
 Strand-Kogleaks
 Strand-Kvik (AP)
 Strandkål (AP)
 Strand-Malurt (AP)
 Strand-Mandstro (HP)
 Strand-Mælde
 Strand-Skræppe (AP)
 Strand-Storkenæb
 Strand-Svingel
 Strand-Trehage (AP)
 Strand-Tusindgylden (HP)
 Strand-Vejbred
 Stribet Kløver (HP)
 Sump-Evighedsblomst
 Sump-Forglemmigej (AP)
 Sump-Nælde (NT)
 Sump-Padderok
 Svalerød (UP)
 Svaleurt
 Svine-Mælde
 Svinesennep
 Sværtøvæld
 Svømmende Vandaks (AP)
 Sylt-Star
 Sød Astragal
 Sø-Kogleaks (AP)
 Tag-Høgeskæg
 Tagrør
 Tandbælg (HP)
 Tandfri Vårsalat
 Ten-Pindsvineknop
 Tidlig Dværgbunke (AP)
 Tidlig Rødtop
 Tigger-Ranunkel

Tofrøet Vikke
 Tomat
 Top-Star (AP)
 Toradet Star (AP)
 Tornet Salat
 Tornet Tidsel
 Tornløs Hornblad (AP)
 Toårig Høgeskæg
 Toårig Natlys
 Trævlekrone (AP)
 Tudse-Siv
 Tue-Siv
 Tusindfryd
 Tvebo Baldrian (HP)
 Tveskægget Ærenpris
 Tyk Andemad
 Tykbladet Fladstjerne (EN)
 Tykbladet Mælde (SP)
 Tykbladet Ærenpris (AP)
 Tyndskulpet Brøndkarse
 Tårnurt
 Udspærret Annelgræs
 Udspærret Dværgbunke (UP)
 Udspærret Vinterkarse
 Uldbladet Kongelys
 Ungarsk Vejsennep
 Ungarsk Vikke, (tjek)
 Vand-Klaseskærm (SP)
 Vand-Mynte (AP)
 Vandnavle (AP)
 Vandpeberrod (AP)
 Vand-Pileurt
 Vand-Skræppe
 Vand-Snerre
 Vand-Ærenpris (AP)
 Vedbend-Ærenpris
 Vejbred-Skeblad
 Vej-Engelskræs (AP)
 Vellugtende Agermåne (SP)
 Vellugtende Gulaks (AP)
 Vild Gulerod
 Vild Hør (HP)
 Vild Kørvel
 Vild Løg
 Vingefrøet Hindeknæ (AP)
 Vinge-Pileurt
 Vintergæk, også fyldte
 Voldtimian (HP)
 Vorterod
 Vår-Brandbæger
 Vår-Gæslingeblomst
 Vår-Potentil (SP)
 Vår-Vikke (HP)
 Æselfoder

Træer og buske
 Ahorn
 Alm. Bukketorn
 Alm. Ene (HP)
 Alm. Hvidtjørn
 Alm. Hyld
 Alm. Hæg
 Alm. Syren
 Ask
 Benved
 Bittersød Natskygge
 Bjerg-Fyr
 Blærespiræa
 Blød Filt-Rose (VU)
 Brombær sp.
 Bævreasp
 Bøg
 Bånd-Pil
 Dun-Birk
 Engriflet Hvidtjørn
 Femhannet Pil
 Fuglekirsebær
 Glansbladet Rose
 Glat Hunderose
 Grå-Pil
 Grå-poppel
 Guldregn
 Hassel
 Have-Ribs
 Havtorn
 Hestekastanje
 Hindbær
 Hjortetaktræ
 Humle
 Hvid-Gran
 Hvid Kornel
 Klatre-Vildvin
 Korbær
 Kortstillet Filt-Rose (SP)
 Kristtorn
 Kræge
 Lav Kornel
 Mirabel
 Navr
 Purpur-Pil
 Robinie
 Rubladet Rose (EN)
 Rynket Rose

Rød-Gran
 Rød Kornel
 Selje-Pil
 Selje-Røn
 Sitka-Gran
 Skov-Elm
 Skov-Fyr
 Skov-Æble (HP)
 Slåen
 Småbladet Elm (NT)
 Småbladet lind (SP)
 Solbær (AP)
 Spids-Løn
 Stikkelsbær
 Stilk-Eg
 Syren
 Sølvregn
 Tørst
 Valnød
 Vedbend
 Vild Ribs
 Vorte-Birk
 Vriertorn (HP)
 Æble-Rose (AP)
 Ægte Kastanje
 Øret Pil (HP)
 Østrigsk Fyr



Vestsiden med de stejle skråninger..

