Rewilding[1] på Røsnæs nord for Bjørnstrup med fokus på floraen



Noget af Røsnæsgårds jorde set mod syd, 2026

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen
Oktober 2026

[1] Rewilding: at gøre naturen selvregulerende ved f.eks. at udsætte store græssende dyr og minimere menneskelig indblanding.

INDLEDNING


David Katznelson købte den 1. januar 2020 Røsnæsgården, Røsnæsvej 400, lige nord for Bjørnstrup. Han ønskede at eje et stykke jord, hvor han kunne lade naturen tage over og selv finde ro ifølge Kristelig Dagblad 14/9 2025. Røsnæsgården ligger i det kuperede Røsnæslandskab med et areal på 13,5 ha (se figur 1), og var dengang tilsået med byg med udlæg af markært. Efter høst er arealet blevet afgræsset af islandske heste, som nu er blevet erstattet af Exmoor-ponyer og Galloway køer.

I 2025 døde ejeren af Hybeshøjgård, som ligger lige øst for Røsnæsgården, og David købte efterfølgende ejendommen november 2025, som omfatter selve bronzealderhøjen Hybeshøj samt det bakkede terræn både nord og syd højen. Det sydlige areal har ligget brak i 2-3 år, det nordlige var udlagt med Raps, og blev efter høst harvet og tilsået med en frøblanding af vilde blomster i december 2025. Selve Hybeshøj har aldrig været dyrket, og her har floraen en høj værdi. De i alt 17 ha afgræsses nu af Exmoor-ponyer.



Figur 1. Røsnæsvej 400 skitseret med blåt og Hybeshøjgård med rødt.

De lokale insisterede på at bibeholde en markvej, der går på tværs nord for Hybeshøj, og vores rapport beskriver floraen på Røsnæsgården (1), Hybeshøj (2), nord for markvejen (3) og syd for markvejen (4), se figur 2.



æ

Figur 2. Ortofoto med Røsnæsgård (Røsnæsvej 400) markeret med blåt (1) og Hybeshøjgård med rødt. Selve Hybeshøj (2) markeret med gult. Nord for markerne er nr. 3, syd for er nr. 4. Fra Arealinformation, Miljøministeriet.

VORES UNDERSØGELSE

Carsten har allerede fra 2020 jævnligt besøgt og lavet floralister over Røsnæsvej 400. Desuden har vi i fællesskab gennem 2026 undersøgt ejendommen Hybeshøjgård og lavet floraliste nord for markvejen nord for Hybeshøj samt en liste syd for markvejen eksklusiv selve Hybeshøj. Området har vi besøgt ca. en gang om måneden fra april til september. Floralisterne står bagerst i rapporten, og vi følger navngivningen af planterne i "Nordens Flora" (Mossberg og Stenberg 2020). Vi har også noteret fugle, sommerfugle, padder mv., når vi stødte på dem.

Tak til David Katznelson for, at vi har måttet undersøge arealerne og for, at han åbner området for alle. Også tak til Brian Kristensen for mange oplysninger.

1. Røsnæsvej 400

Figur 2 viser det undersøgte område, som er markeret med blåt. Efter den sidste høst er jorden ikke blevet dyrket. Siden har markerne været afgræsset af islandske heste, og her i 2026 afgræsses de af både køer og heste gennem hele året. I dag fremstår overdrevet med mange almindelige arter. En enkelt rødlistet art er indvandret, idet Ager-Kohvede (figur 3) blev fundet i 2024. Den står i det NV-lige hjørne ved nogle sten. Ager-Kohvede er rødlistet som Næsten Truet i Rødliste 2019.



Figur 3. Ager-Kohvede fra Røsnæsvej 400.

På orthofotoet figur 2 ses det, at der ligger 2 ret store vådområder på Røsnæsgårdens arealer. Især er det midterste ganske stort, se også foto på forsiden. Vådområdet mod syd er fladvandet. Der findes desuden også et mindre vådt område mod nord. Ifølge CC har der kun været vand i det nordlige om vinteren. Der er en vandpræget vegetation med en del Vand-Mynte i lavningen.

Den midterste sø har i år en vandstand, der er flere meter under vintervandstanden. Her vokser Bredbladet Dunhammer, Tagrør, Strand-Kogleaks, Tigger-Ranunkel mv. og der er Kransnålsalger i selve søen. Der er blishøns, mange fouragerende svaler, og klokkefrøer er hørt i søen. Den sydlige sø er d. 2-6-26 helt udtørret, og bunden er trådt op af dyrene. Blandt planterne er der Strand-Kogleaks, Tigger-Ranunkel, Bittersød Natskygge, Dunet Dueurt og Vejbred-Skeblad. Tidligere så vi levermosset Flydende Skælløv i søen.

Som nævnt vokser der mange almindelige arter på overdrevet som f.eks. Ager-Tidsel, Alm. Hundegræs, Alm. Kongepen, Alm. Hønsetarm, Blød Hejre, Fløjlsgræs, Foder-Vikke, Hvid Kløver og Rejnfan. Det samlede antal er stort, 235 urter og 52 træer og buske, i alt 287 arter, se floralisten bagerst i rapporten. En del af arterne er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper, de såkaldte positiv-arter. De indikerer god naturkvalitet ifølge Leth (2006). Positiv-arterne fra Røsnæsvej 400 står i tabellen herunder:

Positiv-art	**Kategori**
Alm. Fredløs	AP
Asparges	AP
Blodrød Storkenæb	HP
Hare-Kløver	HP
Håret Høgeurt	AP
Håret Star	AP
Hårfliget Vandranunkel	NT
Kantet Perikon	AP
Kær-Dueurt	AP
Kær-Padderok	AP
Nikkende Star	AP
River	HP
Smalbladet Høgeurt	AP
Stor Knopurt	AP
Stribet Kløver	HP
Sump-Forglemmigej	AP
Tornløs Hornblad	AP
Vand-Mynte	AP
Vand-Ærenpris	AP
Vellugtende Gulaks	AP
Vinget Perikon	HP
Vår-Vikke	HP
Småbladet Elm	NT
Øret Pil	HP

Tabel 1. Positiv-arter fra Røsnæsvej 400
AP: Alm. positiv-art
HP: Hist-og-her positiv-art
NT: Næsten Truet

I alt 23 positiv-arter på et overdrev kun 6 år efter dyrkningsophør er ganske pænt. Jorden er sandet, hvilket fremmer overgangen til et godt overdrev med en rig flora. Nogle af arterne er knyttet til vand, og de kan have været der i lang tid. De to "Næsten Truet"-arter står på en regional rødliste (Leth, 2006), ikke den nationale rødliste som Ager-Kohvede gør. Hårfliget Vandranunkel vokser i vand, så den har nok været der meget længe, og Småbladet Elm er slet ikke sjælden på Kalundborg-egnen.

Vi har undret os over forekomsten af endnu en art: Kostblomstret Matrem, se figur 4. Den vokser i øvrigt også syd for markvejen på Hybeshøjgårds arealer. Det er en indført art, som oprindelig



Figur 4. Kostblomstret Matrem i mængde på Røsnæsvej 400. I baggrunden (mod øst) ses Hybeshøj

kommer fra Syd- og Mellemeuropas bjergområder. Den skulle meget sjældent være forvildet i Danmark (Mossberg og Stenberg 2020). Vi så den i 2024 på Asnæs syd for Vesterskov på dyrket mark, og her på Røsnæs står den så også! Gad vide, om den er under kraftig spredning?

Der er en del navneforvirring om arten, Kostblomstret Matrem (*Tanacetum corymbosum*). Den kaldes i Arter.dk for Skærm-Okseøje, hvilket den også gør i Hartvig (2015), mens Rødliste 2019 kalder den Kostblomstret Okseøje.

Faunaen på Røsnæsvej 400 er også bemærkelsesværdige. Der er registreret but- og spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander, skrubtudse og klokkefrø blandt padderne, og af krybdyr er der markfirben og snog (Arter.dk bioblitzer og egne iagttagelser). Der har været en rævegrav med unger. Blandt sommerfugle bemærker vi især okkergul pletvinge blandt de 10 dagsommerfugle, vi har set. Fugle er der en del af, se listen bagi rapporten. Ifølge Kristeligt Dagblads artikel har David og hans venner registreret 600-700 arter indbefattet insekter og andre dyr på Røsnæsvej 400.

2. Hybeshøj

Vi undersøgte højen botanisk i 2021 og supplerede med nogle få besøg i 2022. Vores rapport kom i 2022 (Clausen og Christiansen, 2022). Herunder kommer de vigtigste resultater af undersøgelsen.



Figur 5. Hybeshøj i maj med masser af Bakke-Soløje og Blodstillende Bibernelle.

Hybeshøj er en gravhøj fra bronzealderen. Selve Hybeshøj har aldrig været dyrket, og floraen her er af høj værdi. Tilmed er udsigten fra den 56 m høje bakke fantastisk. Man kan gå til højen ad stien nord for Hybeshøjgård.

Der er 2 Nationalt rødlistede arter på højen, Bakke-Jordbær og Bakke-Soløje.

Bakke-Jordbær er rødlistet som Næsten Truet (NT). Den er er pletvis ret almindelig ved kysterne af Djursland, Øerne og Bornholm og ellers sjælden til meget sjælden, (Hartvig, 2015). Her i Kalundborg kommune vokser den langs hele Røsnæs sydkyst og hist og her langs Asnæs sydkyst (Christiansen et. al. 2009), og den findes også på Nekselø. Det er ikke overraskende at den også er på en græsdækket sydvendt skrænt som Hybeshøj, der aldrig har været opdyrket og gødet. Bakke-Jordbær indikerer høj naturkvalitet, skriver Leth (2006).

Bakke-Soløje er rødlistet som Næsten Truet (NT). Den er ret sjælden i det vestlige Sjælland samt omkring Isefjord og Roskilde Fjord, og ellers sjælden til meget sjælden i Danmark (Hartvig, 2015). Lokalt findes den langs hele Røsnæs sydkyst og også mindst et sted på Asnæs sydkyst (Christiansen et. al. 2009), samt på Nekselø. Også Bakke-Soløje indikerer høj naturkvalitet, skriver Leth (2006).



Figur 6. Bakke-Jordbær. Foto: Ole Agerbæk

Begge arter er vestsjællandske ansvars-arter, da mere end 20 % af arternes danske forekomster er i Vestsjællands amt.

Blodstillende Bibernelle er regionalt rødlistet som Sårbar (VU). Den har tidligere været dyrket, og nogle forekomster stammer utvivlsomt fra forvildede planter. Men forekomsten på kystskrænter kan godt være oprindelige, f.eks. vokser den på kystskrænt ved Nostrup. Også Blodstillende Bibernelle er en vestsjællandsk ansvars-art. (Leth, 2006). På Hybeshøj står den i hundredvis.

På tabel 2 ses Hybeshøjs positiv-arter, hvoraf der er ikke mindre end 32 arter.

Det er bemærkelsesværdigt at finde to nationalt rødlistede arter og en regionalt rødlistet art samt hele 32 positiv-arter på så lille en lokalitet. Men gravhøje er kendt for at kunne rumme mange arter, som vokser på udvasket jord. Desuden har højen aldrig været opdyrket og sprøjtet.



Figur 7. Bakke-Soløje. Foto: Ole Agerbæk

Blandt positiv-arterne findes en orkidé, nemlig Tyndakset Gøgeurt. Oprindeligt er det Peter Jannerup, Kalundborg kommune, som har fundet planten på Hybeshøj. I 2021 fandt vi kun et eksemplar af Tyndakset Gøgeurt på bakken, men i 2026 har Brian Kristensen fundet i alt 4 eksemplarer.

Positiv-art	**Kategori**
Alm. Hvene	AP
Alm. Knopurt	AP
Bakke-Jordbær	UP
Bakke-Soløje	UP
Bidende Stenurt	HP
Bredbladet Timian	HP
Dansk Arum	SP
Dunet Havre	HP
Dunet Vejbred	AP
Engelskgræs	AP

Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hunde-Viol	HP
Håret Høgeurt	AP
Håret Viol	HP
Kantet Perikum	AP
Knoldet Mjødurt	AP
Knold-Ranunkel	AP
Kornet Stenbræk	AP
Mark-Bynke	AP
Mark-Frytle	AP
Mark-Krageklo	AP

Merian	HP
Nikkende Limurt	HP
Segl-Sneglebælg	HP
Stivhåret Kalkkarse	HP
Stor Knopurt	AP
Tyndakset Gøgeurt	UP
Vellugtende Gulaks	AP
Voldtimian	HP

Vår-Star	UP
Æble-Rose	AP

Tabel 2. Positiv-arter fra Hybeshøj
AP: Alm. positiv-art
HP: Hist-og-her positiv-art
UP: Ualmindelig positiv-art
SP: Sjælden positiv-art

3. Nord for markvejen

Området ligger, som figur 2 viser, fra den hegnede markvej og nordpå. Det store overdrev var sidste år tilsået med Raps. I april 2026 var overdrevet helt bart uden en plante, og alt plantemateriale var harvet ned. Desuden har forpagter Peer Ravn tilsået området med en blanding af vilde frø, som han havde tilbage fra et projekt på Knudshoved Odde. Det er Peer Ravns dyr, som går i folden. Formålet med at så frø fra Knudshoved Odde er, at gøre arealet til et overdrev af botanisk set høj værdi hurtigere, end det vil kunne udvikle sig til af sig selv.



Figur 8. Nord for Hybeshøj set imod nord efter planterne har spiret fra den blottede jord, juni 2026.

Ved besøg 28-5-26 var der kommet meget grønt på arealet mest bestående af Hyrdetaske og Lugtløs Kamille samt mange andre enårige arter som Ager-Stedmoderblomst, Raps, Storkronet Ærenpris og flerårige som Ager-Tidsel, Grå-Bynke, Stor Nælde mv. Vi så foreløbig intet til de spændende arter fra Knudshoved Odde udsået af Peer Ravn.

Ved besøget 16-6-26 (figur 8) var der massivt med Lugtløs Kamille og Rank Vejsennep i stor mængde. Nogle steder dækkede Skive-Kamille jordbunden totalt. I august var vegetationen meget tør, og nogle steder var jorden dækket af Spidsbladet Vej-Pileurt (figur 9). De fleste steder var vegetationen ret høj.



Figur 9. Nord for markvejen efter en meget tør eftersommer.

I vandhullet mod vest var der mange Tagrør og Bredbladet Dunhammer, og vandhullet virker meget næringssaltberiget. Længere mod nord er der et par fugtige lavninger på arealet med rigtig meget Tudse-Siv og også den ualmindelige Klæg-Siv. I mosen mod NØ, hvor kun et hjørne er indenfor hegnet, var der meget Tagrør og en kærsanger samt en snog pr. 24/8. Der er også andre vandlidende arealer, hvor Skive-Kamille dækker den i øvrigt meget tørre jord. Ager-Kohvede sås i en lille gruppe nær den fugtige lavning med Tudse-Siv samt mod øst 2 enkelte eksemplarer mere. Vi fandt også et eksemplar midt på arealet, altså 3 forekomster i alt.



Figur 10. Strand-Nellike fra Nord for markvejen.

I eftersommeren fandt vi et enkelt eksemplar af den smukke Strand-Nellike mod nordvest (figur 10). I september fandt vi et eksemplar mere mod øst. Det er en sjælden plante, og den er Næsten Truet (NT) på Rødliste 2019. Den findes ikke på Røsnæs i øvrigt, og man skal til Saltbæk Vig eller ned til Bjerge Stand for at finde den (Arter.dk og Hartvig, 2015). Netop denne art kunne godt stamme fra de udsåede frø, da den findes på Knudshoved Odde.

En anden art, Tadder-Vikke, kunne muligvis stamme fra udsåningen af frø fra Knudshoved Odde projektet, hvor den forekommer mere almindeligt. Den er ifølge Arter.dk. ikke fundet på Røsnæs før, men der er dog en forekomst i Kalundborg ifølge Hartvig (2015).

I krattet mod øst findes en anden mere skovnær flora. Her er Stilk-Eg, Ask, Mirabel, Tjørn og Hyld samt lidt skov-arter som Enblomstret Flitteraks og Stor Konval. Her hørtes en nattergal.

Der findes således 2 rødlistede arter nord for markvejen, nemlig Ager-Kohvede og Strand-Nellike. Begge er de Næsten Truede (NT) på den nationale rødliste.

Positiv-arterne, som indikerer god naturkvalitet står i tabellen herunder. Der er ganske få af den gode grund, at jorden for blot et år siden har været dyrket. Klæg-Siv, Kort Øjentrøst og de to Skjaller-arter er knyttet til vådområderne, som har været der meget længe. Ru Bittermælk er en bemærkelsesværdig forekomst af en sjælden positiv-art (figur 11).

Positiv-art	Kategori
Alm. Gyldenris	AP
Alm. Knopurt	AP
Hare-Kløver	HP
Klæg-Siv	AP
Kort Øjentrøst	UP
Kær-Padderok	AP
Liden Skjaller	SP
Mark-Hindeknæ	HP
Merian	HP
Ru Bittermælk	SP
Stor Knopurt	AP
Stor Skjaller	HP
Vej-Engelskgræs	AP

Tabel 3. Positiv-arter fra Nord for markvejen
AP: Alm. positiv-art
HP: Hist-og-her positiv-art
UP: Ualmindelig positiv-art
SP: Sjælden positiv-art



Figur 11. Ru Bittermælk, en sjælden positiv-art fra Nord for markvejen.

4. Syd for markvejen

Området ligger, som figur 2 viser, syd for Hybeshøj, og der er også en stribe nord for Hybeshøj, som har fået samme behandling som Nord for markvejen. Det bakkede areal lige syd for Hybeshøj har næppe været dyrket på grund af hældningen. Det øvrige areal syd herfor har nok været dyrket for 2-3 år siden med undtagelse af mosen midt på arealet og det lille skovstykke helt imod syd.

Der står adskillige gode arter lige syd for Hybeshøj, som Bakke-Jordbær, Hulkravet Kodriver og Alm. og Stor Knopurt, Blodstillende Bibernelle samt Bredbladet Timian. Nikkende Limurt sås i 5 eksemplarer, og Stivhåret Kalkkarse sås i mange eksemplarer. Men ellers er arealet domineret af ordinære og almindelige arter som Alm. Hundegræs, Vorterod og Vild Kørvel. Området afgræsses af 6 heste og 2 føl fra i år.

Arealet mod øst er domineret af Draphavre. Her gider hestene ikke græsse, og draphavre og andre høje græs står højt.

Bakken ligger sydvendt ned mod mosen. Mosen er domineret af især Vand-Mynte og der er også Bredbladet Dunhammer, Strand-Kogleaks, Sværtevæld og Kattehale. Mange brune frøer var der også, men der var ikke frit vand i mosen gennem hele sommeren.



Figur 12. Udsigt fra Hybeshøj imod syd. I mellemgrunden ses mosen, og i baggrunden ses det lille stykke skov.

Skovstykket SV for mosen og lige ud til grusvejen er domineret af Ahorn og Dun-Birk. Der er også andre arter som Alm. Gedeblad, Spidsløn, Ask og Alm Hæg. I bunden er der meget Stor Konval, Hvid Anemone og Liden Lærkespore. Der er Stikkelsbær og Skov-Elm, Hestekastanie, Stilk-Eg, Engriflet Tjørn mv.

I et haveafsnit, som er inddraget i indhegningen fra Hybeshøjgårds have, er der bl.a. Valnød, Blomme, Have-Æble, Sur-Kirsebær og Dansk Arum.

Der er i alt 3 nationalt rødlistede arter i Syd for markvejen. Der er indvandret både Bakke-Jordbær og Bakke-Soløje fra Hybeshøj til det sandede og skrå areal syd for bakken. Brian har fundet Ager-Kohvede nord for Hybeshøj mod vest. Alle tre arter er "Næsten Truede" på Rødliste 2019. Ager-Kohvede findes således i alt tre steder Nord for markvejen, et sted på Syd for markvejen og mod NV på Røsnæsvej 400.

Foruden de rødlistede arter er der følgende positiv-arter på Syd for markvejen, se tabellen herunder.

19-positiv-arter afspejler naboskabet til selve Hybeshøj og det sydvendte, sandede og kuperede terræn. Mht. sommerfugle, så er det Brian Kristensen, som har fundet og bestemt Fransk Bredpande.

Positiv-art	**Kategori**
Alm. Knopurt	AP
Alm.Pimpernelle	AP
Alm. Sølv-Potentil	AP
Blodstillende Bibernelle	VU
Bredbladet Timian	HP
Dansk Arum	SP
Glat Sølv-Potentil	AP
Hulkravet Kodriver	AP
Håret Høgeurt	AP
Håret Viol	HP
Kort Øjentrøst	UP
Mark-Krageklo	AP
Nikkende Limurt	HP
Stivhåret Kalkkarse	HP
Stor Knopurt	AP
Stribet Kløver	HP
Sump-Forglemmigej	AP
Vand-Mynte	AP
Vej-Engelskgræs	AP

Tabel 4. Positiv-arter fra Syd for Hybeshøj

AP: Alm. positiv-art
HP: Hist-og-her positiv-art
UP: Ualmindelig positiv-art
SP: Sjælden positiv-art
VU: Sårbar (regionalt)

SAMMENFATNING

Røsnæsvej 400 er nu efter 6 års dyrkningsfravær ret rig på plantearter, nemlig 287 stk., og 23 af dem er positiv-arter, som jo indikerer god naturkvalitet. Dertil er der nogle rødlistede arter, se tabel 5. De ret mange arter er også en følge af det store areal. Tilstedeværelsen af faunaen, som især er tilknyttet vådområderne, er også glædeligt.

Hybeshøj har en flora af høj værdi. Artsantallet er ikke stort, men arealet er også ganske lille, ca. 350 m^2. At finde 2 nationale og en regional rødlistet samt hele 32 positiv-arter på så lille et areal, er bemærkelsesværdigt.

Nord for markvejen var helt uden vegetation i april 2026. Fra frø i jorden er der siden spiret 165 arter, som har ligget i jorden eller har været i vådområderne eller i skoven. Der er også tilført arter fra Sydsjælland af Peer Ravn. To rødlistede arter vokser på området, hvor vi tror, at Strand-Nellike er bragt til.

Syd for markvejen rummer ganske mange arter, herunder rødlistede (tabel 5). Floraen beriges af arter fra selve Hybeshøj, som begunstiges af det sandede, sydvendt og skrånende areal. Dertil er der også en mose og et lille skovstykke. Lokaliteten går givetvis en rig fremtid i møde.

David Katznelsons projekt med at bringe det bakkede Røsnæs-landskab imod en bedre naturtilstand, er allerede godt i gang med at lykkes. At lade de førhen dyrkede marker ligge hen med græsning af kvæg og heste gennem hele året tilgodeser i den grad den vilde flora (og fauna), som indvandrer, eller som indføres.

	Røsnæsvej 400	Hybeshøj	Nord for Hybeshøj	Syd for Hybeshøj
Nationalt rødlistede	Ager-Kohvede	Bakke-Jordbær Bakke-Soløje	Ager-Kohvede Strand-Nellike	Bakke-Jordbær Bakke-Soløje Ager-Kohvede
Regionalt rødlistede	Hårfliget Vandranunkel Småbladet Elm	Blodstillende Bibernelle		Blodstillende Bibernelle
Positiv-arter	23	32	13	19
Arter i alt	287	120	165	185

Tabel 5. Plante-arter på de fire undersøgte områder.

LITTERATUR

Arter.dk - er et samarbejde mellem Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF.

Bejder, Eva 2025: Han bor i London og er en internationalt anerkendt filmfotograf. – Kristeligt Dagblad søndag 14. september 2025.

Christiansen, Hans Guldager, Birger Prehn og Ole Agerbæk 2009: Floraen på Røsnæs og Asnæs' sydvendt skrænter. – Kalundborg kommune.

Clausen, Carsten og Hans Guldager Christiansen 2022: Floraen på Hybeshøj, Røsnæs. På DN/Kalundborgs hjemmeside.

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. – Gyldendal.

Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006. - På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens Flora. – Gyldendal. Oversat til dansk og bearbejdet af Jon Feilberg.

Rødliste 2019: Den danske Rødliste. – AU Ecoscience.



Figur 13. Moskus-Katost fra Røsnæsvej 400.

Røsnæsv. 400 Floraliste mv.

Aften-Pragtstjerne
Ager-Gåseurt
Ager-Kohvede
Ager-Padderok
Ager-Sennep
Ager-Snerle
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Ager-Vejbred
Alm. Brandbæger
Alm. Byg
Alm. Fredløs
Alm. Fuglegræs
Alm. Gåsemad
Alm. Hanekro
Alm. Haremad
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvede
Alm. Hvene
Alm. Hønsetarm
Alm. Katost
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Mangeløv
Alm. Markarve
Alm. Pengeurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Rug
Alm. Rødknæ
Alm. Svinemælk
Alm. Syre
Alm. Torskemund
Alm. Vej-Pileurt
Asparges
Bakke-Forglemmigej
Bidende Ranunkel
Bitter-Bakkestjerne
Blank Ærenpris
Bleg Pileurt
Bleggul Snerre
Blod-Kløver
Blodrød Storkenæb
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blæresmælde
Blåhat
Blåstjerne
Bredbladet Dunhammer
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Citronmelisse
Dansk Arum
Draphavre
Dunet Dueurt
Dusk-Syre
Eng-Brandbæger
Eng-Forgemmigej
Eng-Rapgræs
Eng- Rottehale
Eng-Rævehale
Enårig Rapgræs
Feber-Nellikerod
Femhannet Hønsetarm
Fersken-Pileurt
Fiksernellike
Finbladet Rødknæ
Finbladet Vejsennep
Fingerbøl
Fliget Brøndsel
Fliget Tvetand
Foder-Spergel
Foder-Vikke
Fløjlsgræs
Følfod
Gaffel-Vortemælk
Gederams
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Sølv-potentil
Glat Vejbred
Gold Hejre
Græsbladet Fladstjerne
Grøn Høgeskæg
Grå-Bynke
Gul Iris
Gul Kløver
Gul Snerre
Gærde-Valmue
Hare-Kløver
Haremad
Hejrenæb
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Humle-Sneglebælg
Hvid Kløver
Hvidmelet Gåsefod
Hvid Dueurt
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Hyrdetaske
Høst-Borst
Håret Høgeurt
Håret Star
Hårfliget Vandranunkel
Italiensk Rajgræs
Judaspenge
Kantet Dueurt
Kantet Perikon
Kløftet Storkenæb
Kløvplade
Klæbrig Brandbæger
Klæbrig Hønsetarm
Knippe-Star
Knold-Ranunkel
Knold-Rottehale
Knop-Siv
Kornblomst
Korn-Valmue
Kors-Andemad
Korsblomstret Matrem
Krumhals
Kruset Tidsel
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kugle-Museurt
Kæmpe-Stenbræk
Kær-Dueurt
Kær-Galtetand
Kær-Padderok
Kær-Tidsel
Kølle-Valmue
Lancet-Vejbred
Langstakket Væselhale
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Liden Storkenæb
Liden Burre
Liden klokke
Liggende Vej-Pileurt
Liden Singrøn
Lugtløs Kamille
Læge-Hundetunge
Læge-Oksetunge
Løvehale
Lådden Dueurt
Mark-Forglemmigej
Mark-Ærenpris
Mark-Ært
Moskus-Katost
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nikkende Star
Olie-Ræddike
Pastinak
Pengebladet Fredløs
Pindsvineknop sp.
Prikbladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Rank Evighedsblomst
Rank Vejsennep
Rank Surkløver
Raps
Rejnfan
Ris-Dueurt
River
Rundbladet Katost
Ru Svinemælk
Rød Arve
Rød Hestehov
Rød Kløver
Rød Tandbæger
Rød Tvetand
Rørgræs
Sand-Vikke
Sildig Gyldenris
Skive-Kamille
Skov-Jordbær
Skvalderkål
Skærm Vortemælk
Slangehoved

Smalbladet
Dunhammer
Smalbladet Høgeurt
Smalbladet Rødknæ
Smalbladet-Vikke
Småkronet Gedeskæg
Snerle-Pileurt
Spidsbladet Vej-Pileurt
Stinkende Storkenæb
Stor Knopurt
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Stortoppet Hvene
Stor Væselhale
Strand-Kogleaks
Stribet Kløver
Sump-Evighedsblomst
Sump-Forglemmigej
Svine-Mælde
Sværtevæld
Tag-Hejre
Tag-Høgeskæg
Tagrør
Tigger-Ranunkel
Tofrøet Vikke
Toradet Byg
Tornet Salat
Tornløs Hornblad
Tudse-Siv
Tusindfryd
Tyk Andemad
Tyndskulpet Brøndkarse
Uldbladet Kongelys
Vand-Mynte
Vand-Pileurt
Vand-Ærenpris
Vedbend-Ærenpris
Vejbred-Skeblad
Vellugtende Gulaks
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Løg
Vinget Perikon
Vår-Brandbæger
Vår-Gæslingeblomst
Vår-Vikke

Træer/Buske
Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Liguster
Alm. Snebær
Alm. Æblerose
Ask
Benved
Bittersød Natskygge
Bjergfyr
Brombær
Bærmispel
Bøg
Dun-Birk
Engriflet Tjørn
Femhannet Pil
Fuglekirsebær
Glat Hunderose
Grøn El
Guldregn
Gyvel
Hassel
Hestekastanje
Hvid Kornel
Håret Blågrøn Rose
Korbær
Kristtorn
Kræge
Landevejs-Poppel
Lærk
Mirabel
Navr
Paradisæble, (Sargentii)
Pære
Rubladet Rose
Rynket Rose
Rød-Eg
Rød-El
Selje-Røn
Skov-Elm
Skør-Pil
Slåen
Småbladet Elm
Solbær
Stilk-Eg
Syren
Tørst
Valnød
Vinter-Eg
Øret Pil
Østrisk Fyr

Fugle
Agerhøne
Blishøne
Bysvale
Fasan
Fiskehejre
Gransanger
Gråand
Grågås
Grå Krage
Gråstrubet Lappedykker
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger
Gøg
Hvid Vipstjert
Kærsanger
Landsvale
Lille Lappedykker
Lille Regnspove
Musvit
Ravn
Ringdue
Rød Glente
Rørhøg
Rørsanger
Råge
Sangdrossel
Sanglærke
Sjagger
Skovskade
Skovspurv
Solsort
Stor Regnspove
Tornsanger

Andet
Blodrød Hedelibel
Blå Libel
Blå Mosaikguldsmed
Brun Frø
Fireplettet Libel
Flydende Skælløv
Hare
Klokkefrø
Kransnålalge sp.
Kæmpe Støvbold
Markfirben
Ræv (unger i grav)
Rådyr
Skrubtudse
Stor Gedehams
Stor Vandsalamander
Vandnymfe
Vinbjergsnegl
Vortebider

Sommerfugle
Alm. Blåfugl
Gammaugle
Græsrandøje
Lille Ildfugl
Lille Kålsommerfugl
Okkergul Pletvinge
Okkergul Randøje
Stor Bredpande
Stor Kålsommerfugl
Tidselsommerfugl

Hybeshøj
Aften-Pragtstjerne
Ager-Mynte
Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Tidsel
Alm. Agermåne
Alm. Fuglegræs
Alm. Hundegræs
Alm. Hønsetarm
Alm. Hvene
Alm. Knopurt
Alm. Kællingetand
Alm. Markarve
Alm. Pimpinelle
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Syre
Alm. Sølv-Potentil
Bakke-Forglemmigej
Bakke-Jordbær
Bakke-Soløje
Bidende Ranunkel
Bidende Stenurt
Bitter Bakkestjerne
Bleggul Snerre
Blodstillende Bibernelle
Blæresmælde
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blåhat
Bugtet Kløver
Bredbladet Timian
Burre-Snerre
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Dansk Arum
Draphavre
Dunet Hejre
Dunet Vejbred
Dusk-Syre
Eng-Brandbæger
Feber-Nellikerod
Foder-Lucerne
Gold-Hejre
Græsbladet Fladstjerne
Gråbynke
Gul Fladbælg
Gul Snerre
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore
Humle-Sneglebælg
Hunde-Viol
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Håret Høgeurt
Håret Sølv-Potentil
Håret Viol
Italiensk Rajgræs
Kantet Perikon
Knoldet Mjødurt
Knold-Ranunkel
Knold-Rottehale
Kornet Stenbræk
Krat-Viol
Krybende Potentil
Liden Klokke
Lugtløs Kamille
Læge-Oksetunge
Mark-Bynke
Mark-Forglemmigej
Mark-Frytle
Mark-Krageklo
Mark-Ærenpris
Merian
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nikkende Limurt
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Raps
Rejnfan
Rød Svingel
Rød Tvetand
Sand-Lucerne
Segl-Sneglebælg
Skovarve
Slangehoved
Småkronet Gedeskæg
Stivhåret Kalkkarse
Stor Fladstjerne
Stor Knopurt
Storkronet Ærenpris
Stor Nælde
Strand-Engelskgræs
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Tyndakset Gøgeurt
Tårnurt
Vedbend-Ærenpris
Vellugtende Gulaks
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Løg
Voldtimian
Vorterod
Vår-Star

Træer/buske
Ahorn
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Liguster
Benved
Brombær
Dunet Gedeblad
Engriflet Hvidtjørn
Glat Hunderose
Korbær
Skov-Elm
Slåen
Stikkelsbær
Æble-Rose

Sommerfugle
Dagpåfugleøje
Græsrandøje
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Okkergul
Pletvinge
Okkergul Randøje
Stor Kålsommerfugl
Vejrandøje

Fugle
Gransanger
Gråkrage
Landsvale
Mursejler
Musvåge
Sanglærke
Skovskade
Solsort
Ringdue

Andet
Kæmpe Støvbold
Vårmusseron
Rådyr

Nord for markvejen

Urter
Ager-Kohvede
Ager-Padderok
Ager-Sennep
Ager-Stedmoderblomst
Ager-Tidsel
Ager-Vejbred
Alm. Brandbæger
Alm. Fuglegræs
Alm. Gyldenris
Alm. Gåsemad
Alm. Haremad
Alm. Hundegræs
Alm. Hvede
Alm. Hønsetarm
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Rødknæ
Alm. Røllike
Al. Svinemælk
Alm. Torskemund
Alm. Vej-Pileurt
Bleg Pileurt
Bleggul Snerre
Bitter Bakkestjerne
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blåstjerne
Bredbladet Dunhammer
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Dag-Pragtstjerne
Dunet Dueurt
Draphavre
Enblomstret Flitteraks
Enårig Rapgræs
Farve-Gåseurt
Feber-Nellikerod
Fersken-Pileurt
Fin Kløver
Finbladet Vejsennep
Fliget Brøndsel
Fliget Tvetand
Fløjlsgræs
Foder-Vikke
Gaffel-Vortemælk
Glanskapslet Siv
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Gold Hejre
Grøn Høgeskæg
Grå-Bynke
Gul Iris
Gul Kløver
Gærde-Valmue
Hare-Kløver
Hjortetrøst
Hjulkrone
Horse-Tidsel
Hundepersille
Humle-Sneglebælg
Hvid Kløver
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvidmelet Gåsefod
Hyrdetaske
Høst-Borst
Høst-Rødtop
Kantet Dueurt
Klæbrig Brandbæger
Klæg-Siv
Knold-Rottehale
Knæbøjet Rævehale
Korn-Valmue
Kornblomst
Kort Øjentrøst
Krumhals
Kruset Skræppe
Kryb-Hvene
Kugle-Museurt
Kær-Padderok
Kølle-Valmue
Lancet-Vejbred
Lav-Ranunkel
Liden Skjaller
Liden Tvetand
Lådden Dueurt
Lugtløs Kamille
Lund-Rapgræs
Læge-Jordrøg
Læge-Oksetunge
Mark-Forglemmigej
Mark-Hindeknæ
Merian
Miliegræs
Mælkebøtte ssp.
Nat-Limurt
Olie-Ræddike
Rank Vejsennep
Raps
Rejnfan
Ru Bittermælk
Ru Svinemælk
Rød Arve
Rød-Kløver
Rød Svingel
Rød Tvetand
Skærm-Vortemælk
Slangehoved
Smalbladet Dunhammer
Skive-Kamille
Smalbladet Vikke
Snerle-Pileurt
Spidsbladet Vej-Pileurt
Stor Fladstjerne
Stor Knopurt
Stor Konval
Stor Nælde
Stor Skjaller
Stor Væselhale
Stortoppet Hvene
Storkronet Ærenpris
Strand-Kamille
Strand-Kogleaks
Strand-Nellike
Sump-Evighedsblomst
Svine-Mælde
Sværtevæld
Tagrør
Tadder-Vikke
Tigger-Ranunkel
Tudse-Siv
Tusindfryd
Uldbladet Kongelys
Vand-Pileurt
Vedbend-Ærenpris
Vej-Engelskgræs
Vejbred-Skeblad
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vindaks

Træer og buske
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Ask
Benved
Bittersød Natskygge
Brombær sp.
Bånd-Pil
Drue-Hyld
Engriflet Hvidtjørn
Glansbladet Rose
Glat Hunderose
Gråpil
Hassel
Humle
Mangeblomstret Rose
Mirabel
Stikkelsbær
Stilk-Eg

Fugle
Bogfinke
Fasan
Gulbug
Gøg
Hættemåge
Kærsanger
Landsvale
Munk
Nattergal
Ravn
Ringdue
Sanglærke
Solsort
Strandskade
Tornsanger

Sommerfugle
Dagpåfugleøje
Grønåret kålsommerfugl
Lille lldfugl
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Storplettet Perlemorssommerfugl
Tidselsommerfugl

Andet
Brun Frø
Gammaugle
Hare
Snog

Syd for markvejen

Ager-Padderok
Ager-Snerle
Ager-Sted-moderblomst
Ager-Tidsel
Alm. Agermåne
Alm. Brandbæger
Alm. Brunelle
Alm. Fuglegræs
Alm. Gåsemad
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hønsetarm
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kællingetand
Alm. Mangeløv
Alm. Pimpinelle
Alm. Rajgræs
Alm. Rødknæ
Alm. Røllike
Alm. Svinemælk
Alm. Sølv-Potentil
Alm. Vej-Pileurt
Bakke-Forglemmigej
Bakke-Jordbær
Bakke-Soløje
Bakke-Svingel
Bidende Ranunkel
Bidende Stenurt
Bitter Bakkestjerne
Bleggul Snerre
Blodstillende Bibernelle
Blæresmælde
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blågrøn Kogleaks
Blåhat
Blåstjerne
Bredbladet Dunhammer
Bredbladet Timian
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Dansk Arum
Draphavre
Dunet Vejbred
Enblomstret Flitteraks
Eng-Brandbæger
Eng-Rapgræs
Feber-Nellikerod
Fersken-Pileurt
Fløjlsgræs
Foder-Lucerne
Foder-Vikke
Følfod
Gederams
Glat Vejbred
Glat Sølv-Potentil
Gold Hejre
Græsbladet Fladstjerne
Grøn Høgeskæg
Grå-Bynke
Gul Snerre
Gul Kløver
Gåsepotentil
Haremad
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Humle-Sneglebælg
Hvid Dueurt
Hvid Kløver
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvidmelet Gåsefod
Hyrdetaske
Høst-Borst
Høst-Rødtop
Håret Høgeurt
Håret Viol
Kattehale
Kløvplade
Kinajute
Kirtlet Dueurt
Knold-Rottehale
Kornblomst
Korn-Valmue
Korsknap
Kort Øjentrøst
Kostblomstret Matrem
Kinajute
Krat-Ærenpris
Krumhals
Kruset Skræppe
Krybende Potentil
Kugle-Museurt
Lav Ranunkel
Lancet-Vejbred
Liden Andemad
Liden Tvetand
Liden Vortemælk
Lugtløs Kamille
Lund-Rapgræs
Læge-Oksetunge
Lådden Dueurt
Mark-Bynke
Mark-Forglemmigej
Mark-Krageklo
Mark-Ærenpris
Miliegræs
Mælkebøtte ssp.
Nikkende Limurt
Olie-Ræddike
Pastinak
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Rank Vejsennep
Rejnfan
Ru Svinemælk
Rød Arve
Rød-Kløver
Rød Svingel
Rød Tvetand
Sand-Lucerne
Skov-Løg
Skærm-Vortemælk
Slangehoved
Smalbladet Dunhammer
Smalbladet Vikke
Småkronet Gedeskæg
Snerle-Pileurt
Spidsbladet Vej-Pileurt
Star sp.
Stinkende Storkenæb
Stivhåret Kalkkarse
Stor Knopurt
Stor Nælde
Stor Væselhale
Storkronet Ærenpris
Strand-Kamille
Stribet Kløver
Sump-Evighedsblomst
Sump-Forglemmigej
Svine-Mælde
Sværtevæld
Tofrøet Vikke
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Vand-Mynte
Vedbend-Ærenpris
Vej-Engelskgræs
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vorterod
Vår-Gæslingeblomst

Træer og buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hæg
Alm. Liguster
Alm. Røn
Ask
Bittersød-Natskygge
Blomme sp.
Brombær sp.
Engriflet Tjørn
Fugle-Kirsebær
Glat Hunderose
Grøn El
Have-Æble
Korbær
Mirabel
Selje-Røn
Skov-Elm
Slåen
Spids-Løn
Sur-Kirsebær
Stilk-Eg
Valnød
Vedbend

Fugle

Fasan
Gransanger
Grågås
Gulspurv
Gøg
Hættemåge
Landsvale
Rød Glente
Råge
Stor Flagspætte
Stær
Tornsanger
Tårnfalk

Sommerfugle

Admiral
Alm. Blåfugl
Aurora
Fransk Bredpande
Lille Ildfugl
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Okkergul Pletvinge
Rødplettet Blåfugl

Andet

Brun frø
Markfirben
Pindsvin (død)
Rævegrav
Spidsmus (død)
Vinbjergsnegl